국립공원 공원자원조사 현지조사표 통합DB 구축

공원
정책

—

생태
자원

—

모니
터링

—

문화
자원

—

안전
방재

| 참여연구진 |

본 『국립공원 공원자원조사 현지조사표 통합DB 구축』은 다음과 같은 연구진에 의하여 수행되었습니다.

총괄			
사업총괄	최승운	국립공원연구원	원장
연구총괄	채희영	국립공원연구원	정책개발실장
총괄책임	김태근	국립공원연구원	평가분석부장
연구진			
연구책임	김종필	국립공원연구원	계장
참여연구원	박정원	국립공원연구원	선임연구위원
	이정영	국립공원연구원	과장
	박승철	국립공원연구원	책임연구원
	심유미	국립공원연구원	계장
	나일한	(주)아프로시스	이사
	황호선	(주)아프로시스	차장
	김은영	(주)아프로시스	차장
	장내호	(주)아프로시스	대리
	김다훈	(주)아프로시스	사원
	김한순	경북대학교	교수
	최재신	경북대학교	교수

I. 서론	3
1. 연구 배경	3
가. 정보 활용에 존재하는 한계 극복	3
2. 연구 목적	3
가. 자료의 무결성	3
나. 업무의 효율성	3
다. 정보의 활용성	3
II. 본론	7
1. 1기 자연자원조사 생물 종 목록 자료추출	7
가. 1기 자연자원조사 자료추출	7
나. 1기 자연자원조사 입력검증	10
2. 현지조사표(1~3기) 자료 통합을 위한 DB 구조 재설계	11
가. 2019년 구축한 격자 데이터의 전환	11
나. 2·3기 공원지원 보고서 비교를 위한 통계자료 추출	19
다. 2·3기 불필요컬럼 정비	22
3. 공원지원조사 정보분석시스템 데이터베이스 탑재	23
가. 1기 데이터 DB화 진행	23
나. 1기 데이터 시스템 로딩	25
다. 1기 데이터 시스템 반영	26
4. 4기 보고서 비교	29
가. 4기 데이터 입력 현황	29
나. 4기 데이터 시스템 반영	31
III. 결론	37
IV. 부록	41
1. 정보분석시스템 데이터 현황	41
2. 국립공원 담수조류 종 목록 재검토	53

| 표목차 |

[표 1] 1기 자연자원조사 테이블 구성도	23
-------------------------------	----

| 그림목차 |

[그림 1] 자연자원조사 보고서(예시)	7
[그림 2] 1기 자연자원조사 보고서의 수집 및 정형화 예시	8
[그림 3] 시스템 입력을 위한 데이터 추출 예시	8
[그림 4] 공원별_총계	9
[그림 5] 검수를 위한 공원별 통계 및 세부항목(예시)	9
[그림 6] 1기 전체 데이터(일부)	10
[그림 7] 분류군별 1기 데이터 통계 현황	10
[그림 8] national_point_p 파티션 테이블 목록	17
[그림 9] national_point_p_100 파티션 테이블 목록	17
[그림 10] national_point_p_1000 파티션 테이블 목록	17
[그림 11] 10m 격자데이터 입력에 해당하는 리스트(예시)	18
[그림 12] 국가생물종 전환 전 통계(2기)	19
[그림 13] 국가생물종 전환 전 세부내역(2기 가야산)	20
[그림 14] 국가생물종 전환 후 통계(2기)	20
[그림 15] 2기 보고서와 현지조사표 비교 예시	21
[그림 16] 2·3기 테이블 컬럼 통계(일부)	22
[그림 17] 데이터 저장을 위한 CSV 파일 예시	25
[그림 18] 1기 시스템 검수(가야산)	26
[그림 19] 1기 통계 기능(가야산)	27
[그림 20] 1기 분류군 통계	27
[그림 21] 1기 공원별 통계	28
[그림 22] 4기 조사분야(식물상) 파일 예시	29
[그림 23] 4기 보고서와 현지조사표 비교 예시	30
[그림 24] 4기 시스템을 통한 검증(한려해상-식물상)	31
[그림 25] 4기 통계기능 (한려해상-식물상)	31
[그림 26] 4기 공원별 통계	32
[그림 27] 4기 분류군 통계	32
[그림 28] 4기 생물종 통계	33

1. 연구 배경

- 본 연구는 엑셀파일 기반으로 관리되고 있는 공원자원조사 결과를 전산화하여, 정보의 활용에 있어 존재하는 한계를 극복하고자 추진된 사업으로서, 조사결과를 정비할 수 있는 시스템을 구축하여 생물 다양성 주제도의 근간이 되는 신뢰성 있는 자료를 제작하고 조사 결과를 적극 활용하기 위한 활용을 모색하고자 추진되었다.
- 현재 국내 국립공원공단에서 GIS 데이터를 이용할 수 있는 기반은 어느 정도 구축되었다고 하나 실제로 그 프레임 워크를 통해 구축된 데이터를 이용할 수 있는 사용자는 극히 일부분에 국한된 상태이다. 그 이유는 데이터를 사용하는 입장에서 아직 실질적으로 GIS 데이터를 이용한 방식에 대한 인식이 부족하기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 확산의 단계로서 국가지점번호 기반의 격자형 주제도로 발전시키고 잘 구축된 GIS 데이터를 조사 및 연구 분야에 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 제시함으로써 향후 GIS 데이터를 활용할 수 있는 가이드라인을 제공할 것으로 기대한다.

2. 연구 목적

- 본 연구에서는 먼저 2002년부터 2019년 공원자원조사 현지조사표 엑셀 파일을 수집하여 조사 당시의 GPS 좌표와 발견된 생물종 정보 등 조사된 모든 정보를 DB에 적재하고, SQL 등의 전산 기법을 적용하여 수집된 데이터의 내용에 대한 정비를 진행한다.
- 이 과정에서 데이터의 형태 및 정규식을 활용한 정형화된 정비 과정의 한계를 극복하기 위하여 전문가가 지속적으로 정비할 수 있는 시스템을 개발하여 신뢰성 향상을 위한 기반을 마련하고, GIS 데이터를 조사 분야에 대한 업무 분석을 통하여 공원자원 분야의 업무에 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 모색함으로써, 데이터의 활용성을 높이고자 한다.

3. 연구 내용

○ 1기 자연자원조사 생물 종 목록 자료추출 및 1기/4기 시스템 반영

- 먼저 비정형 데이터인 1기 자연자원조사 보고서를 정형화된 데이터로 전환하는 작업을 진행하여 1기 데이터에 대한 전산화 작업을 수행한다. 이 과정에서 공원별 조사항목에 대한 기록과 특이사항등 엑셀 항목을 추가하여 엑셀 자료로 제작하였다.
- 1기 데이터를 데이터베이스에 입력하기 위하여 공원, 국명, 학명등을 별도로 추출하여 CSV파일로 제작하였고 해당 CSV파일을 POSTGRESQL의 관리툴인 PGADMIN을 활용하여 데이터베이스에 저장하였다.
- 위의 과정에 대한 검증을 위하여 2차례 수작업을 통해 추출데이터를 확인하였고, 데이터베이스에 입

력된 국명과 학명 기반으로 2019년 정보분석시스템에서 진행한 국가생물종 전환 작업을 진행하여 국명_new, 학명_new, 공원_new 등을 추가하여 시스템에서 활용할 수 있도록 하였다.

- 1기/2기/3기/4기 데이터의 속성이 상이하여 프로그램 코드에서 많은 기수별 분기 처리가 필요했고 이를 통하여 한 화면에서 검색, 조회, 통계가 가능하도록 개발하였다. 그 과정에서 각 기수별 조사현황 테이블이 필수로 필요하게 되었고 조사된 통계를 기반으로 제작하여 참조하도록 구현하였다.

○ DB 구조 재설계

- 정보분석시스템의 경우 데이터는 조사된 레거시 데이터를 기반으로 설계되어 있고 데이터의 통일성을 기반으로 시스템이 개발된 것이 아닌 프로그램 코드에 의존하여 데이터를 표출하고 있다. 향후 안정적인 운영을 위하여 데이터의 재설계가 필요하고 이를 위하여 각 속성별 점유율을 추출하였다.
- 속성별 점유율(NotNull 레코드/총 레코드)를 기반으로 각 조사분야별 데이터 정비를 진행하지만 정비 과정에서 레거시 데이터의 유실을 방지하고자 복사된 다른 스키마에서 속성 간 통폐합 작업을 진행하여 시스템의 안정성을 확보하였다.

I

서론

1. 연구 배경
2. 연구 목적

I. 서론

1 연구 배경

가. 정보 활용에 존재하는 한계 극복

현지조사자료를 엑셀 기반으로 관리하여 보관 및 활용에 한계가 있고, 이를 극복하고자 전산화를 통한 정보공유체계 마련하여 데이터 관리와 활용성을 향상할 필요성이 제기되었음

(1) 연구목적 데이터를 구축 및 관리

- ① 엑셀 기반으로 관리되는 현지조사자료의 관리 체계 필요
- ② 원본 DB와 수정 DB 별도 관리 필요성 확대
- ② GIS 정보의 활용성 증대되는 추세 (쉬운 GIS 자료 필요)

2 연구 목적

가. 자료의 무결성

과거 현지조사표 데이터를 정비하여 신뢰성 향상

- (1) 편리하고 간결한 검수·수정·활용 도구 제공
- (2) 조사데이터의 국가생물종 전환지원 추가

나. 업무의 효율성

현지조사 현황에 대한 관리시스템이 필요하다는 사용자의 요구사항을 바탕으로 추진됨

- (1) 조사현황 리포팅 기능을 통한 업무 효율성 향상

다. 정보의 활용성

검증된 오픈소스 QGIS 엔진을 활용한 표준화 지원 도구 제공

- (1) C/S 기반의 GIS 시각화 도구
- (2) 공원자원조사 데이터의 검증 관리 표준화 지원 및 정보 분석 도구

II

본론

1. 1기 자연자원조사 생물 종 목록 자료추출
2. 현지조사표(1~3기) 자료 통합을 위한 DB 구조 재설계
3. 공원지원조사 정보분석시스템 데이터베이스 탑재
4. 4기 보고서 비교

II. 본 론

1 1기 자연자원조사 생물 종 목록 자료추출

가. 1기 자연자원조사 자료추출

먼저, 1992년 북한산, 설악산, 한라산국립공원 조사 자료부터 1999년까지의 변산반도 pdf 자료 20개 파일을 전달받아, 이를 DB에 저장하기 위하여 변환하였고, 자료 저장을 위한 DB 설계 및 현황을 분석을 위한 기초 자료로 저장함

(1) 수집대상 : (1기 공원자원조사 데이터)

① 파일 개수 : 1992년 ~ 1999년 (20개 파일)

(2) 엑셀 파일 분석 및 조사항목 정리

- 20개 자연자원조사보고서 pdf파일(이하 보고서)의 시트명과 칼럼명을 수집 분석함
- 수집된 파일을 하나하나 열어 국립공원(시트명)과 조사분야(칼럼)을 모두 기록함

2. 植物目錄	
Lycopodiaceae 석송 과	
<i>Lycopodium chinense</i> Christ	다람쥐꼬리
<i>Lycopodium clavatum</i> var. <i>nipponicum</i> Nakai	석송
<i>Lycopodium complanatum</i> L.	비늘석송
<i>Lycopodium cryptomerinum</i> Max.	왕다람쥐꼬리
<i>Lycopodium integrifolium</i> Matsuda et Nak.	긴다람쥐꼬리
<i>Lycopodium obscurum</i> L.	만년석송
<i>Lycopodium serratum</i> Thunb.	램플
<i>Lycopodium sieboldii</i> Miq.	줄석송
Selaginellaceae 부처손 과	
<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Link	왜구실사리
<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	바위손
<i>Selaginella remotifolia</i> S.	비늘이끼
<i>Selaginella tamariscina</i> (Beanv.) Spring	부처손
Fruisetaaceae 손새 과	

[그림 1] 자연자원조사 보고서(예시)

국립공원명	조사분야	학명	대표국명	1차 (97.2.21~2.23)	2차 (97.7.10~7.12)	3차 (97.10.23~10.25)	Total	Dom.	R.D	
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Egretta alba modesta	중대백로			2	1	3	0.24	0.89
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Egretta garzetta	쇠백로				1	1	0.08	0.3
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Ardea cinerea	왜가리			1	1	1	0.08	0.3
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Accipiter soloensis	붉은배새매			2	2	2	0.24	0.89
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Accipiter nisus	새매	1			1	2	0.16	0.59
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Phasianus colchicus	꿩	2	1		3	3	0.24	0.89
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Streptopelia orientalis	멧비둘기	55	56		5	116	9.27	34.42
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Cuculus canorus	빠꾸기			4	4	4	0.32	1.19
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Cuculus poliocephalus	두견			1	1	1	0.08	0.3
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Otus scops	소쩍새			1	1	1	0.08	0.3
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Caprimulgus indicus	썩독새			1	1	1	0.08	0.3
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Halcyon pileata	청호반새			1	1	1	0.08	0.3
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Picus canus	청딱다구리			2	2	2	0.16	0.59
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Dendrocopos kizuki	쇠딱다구리	2			2	4	0.32	1.19
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Hirundo rustica	재비			3	3	3	0.24	0.89
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Motacilla cinerea	노랑할미새			4	4	4	0.32	1.19
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Motacilla alba leucopsis	알락할미새			2	2	2	0.16	0.59
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Anthus hodgsoni	황동새				4	4	0.4	1.48
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Hypsipetes amaurotis	직박구리	15	9		25	49	3.92	14.54
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Lanius tigrinus	참딱따구리			1	1	1	0.08	0.3
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Lanius bucephalus	때까치	2	2		4	8	0.64	2.37
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Cinclus pallasii	물까마귀	1	1		2	2	0.16	0.59
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Troglodytes troglodytes	검목새	1			1	2	0.16	0.59
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Prunella motanella	멧종다리	1			1	1	0.08	0.3
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Erithacus cyane	쇠유리새			1	1	1	0.08	0.3
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Phoenicurus aureus	딱새	8	5		25	38	3.04	11.28
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Saxicola torquata	검은딱새			2	2	2	0.16	0.59
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Turdus pallidus	흰배지빠귀			2	2	2	0.16	0.59
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Turdus naumanni eunomus	개동지빠귀	3			3	6	0.48	1.78
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Paradoxornis webbiana	붉은머리오목눈이	56	32		249	337	26.94	100
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Cettia squameiceps	숨새			2	2	2	0.16	0.59
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Cettia diphone	휘파람새			2	2	2	0.16	0.59
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Regulus regulus	삼모솔새	6			6	6	0.48	1.78
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Aegithalos caudatus	오목눈이	35	7		52	94	7.51	27.89
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Parus palustris	쇠박새	4	5		8	17	1.36	5.04
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Parus ater	진박새	5			1	6	0.48	1.78
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Parus varius	곤줄박이	12			16	28	2.24	8.31
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Parus major	박새	16	8		28	52	4.16	15.43
가야산-97년 조류조사 결과표	조류	Sitta europaea	등고비				3	3	0.24	0.89

[그림 2] 1기 자연자원조사 보고서의 수집 및 정형화 예시

- 비정형 데이터의 정형화를 작업 시, 향후 활용을 위하여 보고서에 존재하는 속성 일체를 기록하고 데이터 입력을 위한 추출 작업 진행함

국립공원	조사분야	학명	국명
가야산	곤충	Homidia grisea	회색뿔뚝뚜기
가야산	곤충	Ameletus costalis	큰참날개하루살이
가야산	곤충	Ephemera strigata	무늬하루살이
가야산	곤충	Lyriothemis pachygastra	베치레잠자리
가야산	곤충	Paragnetina flavotincta	강도래붙이
가야산	곤충	Phaneroptera falcata	실베짱이
가야산	곤충	Paratlanticus ussuriensis	갈색여치
가야산	곤충	Gastrimargus marmoratus	콩중이
가야산	곤충	Metylophorus nebulosus	다듬이벌레
가야산	곤충	Nepa hoffmanni	메추리장구애비
가야산	곤충	Notonecta (Paranecta) triguttata	송장해엄치게
가야산	곤충	Anoplophora malasiaca	알락하늘소
가야산	곤충	Calopteryx atrata	검은물잠자리
가야산	곤충	Cercion hieroglyphicum	등줄실잠자리
가야산	곤충	Tomocerus (Tomocerina) violaceus	보라가시뿔뚜기
가야산	곤충	Sinella (Sinella) curviseta	어리털뿔뚜기
가야산	곤충	Homidia bilineata	두줄뿔뚜기
가야산	곤충	Leptura arcuata	긴알락꽃하늘소(알락꽃하늘소)

[그림 3] 시스템 입력을 위한 데이터 추출 예시

정형화된 1기 자연자원조사 데이터의 현황 집계

1기 데이터 입력 현황														
국립공원명	공원별 총계	곤충	담수어류	식물상	조류	양서·파충류	포유류	해양생물상	해양동물상	부착관생물상	해산어류	해조생물상	고등균류	완료여부
계룡산	137	20	24		52	16	25							완
내장산	137	6	12	8	67	21	23							완
덕유산	325	18	19	112	123	21	32							완
북한산	262			126	136									완
설악산	645	27	61	402	94	23	38							완
솔리산	412	17	26	208	125	20	16							완
오대산	150		28		76	21	25							완
주왕산	2249	818	17	882	263	146	123							완
지리산	4417	2534	30	1604	189	22	38							완
지악산	2205	1300	23	737	94	23	28							완
태안해상	2665	473		693	686	15		564	180		53	1		완
한려해상	783	17	69		112	18	14	128	323	102				완
다도해해상(남해)	2621	129	244	1444	251	9	10	534						완
한라산	2745	1641		1051	18	18	17							완
돌악산	1345	733	20	498	54	18	22							완
가야산	2693	1230	18	1149	206	90								완
다도해해상(서해)	2482	300	26	1221	210	6	5	492			222			완
소백산	3539	1547	40	1702	213	14	23							완
월출산	452	16	29	356	13	21	17							완
변산반도	1884	688	23	876	95	25	21						156	완
총계	32148	11514	709	13069	3077	547	477	1718	503	102	275	1	156	

[그림 4] 공원별 총계

- 보고서 파일에 나열된 조사항목을 기준으로 국립 공원(사이트명)로 세부 내역을 작성함
- 나열된 조사항목을 기준으로 DB 테이블을 설계하여 데이터를 저장함

국립공원명	지역명	조사일자	분류군	Phylum	문	Class	강	Order	목	Family	속	명칭	영양위	대표종명
계룡산	계룡	2020	곤충					Coleoptera	딱정벌레목	Cetoniidae	종유지과	<i>Prostera brevitarsis sealeris</i>	식물	종유지과 딱정벌레
계룡산	계룡	2020	곤충					Coleoptera	딱정벌레목	Chrysomelidae	잎벌레과	<i>Lema (Lema) coronata</i>	식물	카사리 딱정벌레
계룡산	담수어류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Magalodontidae	멋사우벌레과	<i>Magalodonta sibiricus</i>	식물	멋사우벌레
계룡산	식물상	2020	식물					Hymenoptera	벌목	Eumenidae	표리벌레과	<i>Anterhynchum flavomarginatum flavomarg</i>	식물	황색갈색표리벌레
계룡산	조류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Eumenidae	표리벌레과	<i>Euclyptus dentic</i>	식물	표리벌레
계룡산	양서·파충류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Sphacidae	구멍벌과	<i>Gorytes radostoloidyi</i>	동물	황금노랑표리벌레
계룡산	포유류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Sphacidae	구멍벌과	<i>Bembexius hungaricus formosanus</i>	동물	대왕노랑표리벌레
계룡산	해양생물상	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Apidae	꿀벌과	<i>Apis mellifera</i>	동물	왕봉꿀벌
계룡산	해양동물상	2020	동물					Coleoptera	딱정벌레목	Buprestidae	비단벌레과	<i>Buprestis haemorrhoidalis</i>	동물	고려비단벌레
계룡산	부착관생물상	2020	동물					Coleoptera	딱정벌레목	Chrysomelidae	잎벌레과	<i>Physomeradina nigritrons</i>	동물	반나뉘 잎벌레(검은리코아 잎벌레)
계룡산	해산어류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Argidae	종이벌레과	<i>Arga conruipeennis</i>	동물	종이벌레(검은리코아 잎벌레)
계룡산	해조생물상	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Eumenidae	표리벌레과	<i>Eumenes archidectus</i>	식물	연꽃표리벌레
계룡산	고등균류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Eumenidae	표리벌레과	<i>Euclyptus quadrifasciatus</i>	식물	방랑표리벌레
계룡산	고등균류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Sphacidae	구멍벌과	<i>Cercaris hortivaga</i>	동물	노랑기벌
계룡산	고등균류	2020	동물					Mecoptera	검물기목	Panorpidae	검물기과	<i>Panorpa amurensis</i>	동물	MacLachlan 검물기
계룡산	고등균류	2020	동물					Coleoptera	딱정벌레목	Buprestidae	비단벌레과	<i>Corobius kangsanus</i>	동물	검물기(검물기)
계룡산	고등균류	2020	동물					Coleoptera	딱정벌레목	Chrysomelidae	잎벌레과	<i>Cryptocaphalus approximatus</i>	동물	검물기(검물기)
계룡산	고등균류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Argidae	종이벌레과	<i>Arga pagana pagana</i>	동물	검물기(검물기)
계룡산	고등균류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Eumenidae	표리벌레과	<i>Eumenes pomiformis</i>	동물	검물기(검물기)
계룡산	고등균류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Eumenidae	표리벌레과	<i>Oikumenes decoratus</i>	동물	검물기(검물기)
계룡산	고등균류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Sphacidae	구멍벌과	<i>Cercaris rabidosa subglobosa</i>	동물	검물기(검물기)
계룡산	고등균류	2020	동물					Mecoptera	검물기목	Panorpidae	검물기과	<i>Panorpa coreana</i>	동물	검물기(검물기)
계룡산	고등균류	2020	동물					Coleoptera	딱정벌레목	Elateridae	땅벌레과	<i>Agrypnus argilaceus</i>	동물	대왕땅벌레
계룡산	고등균류	2020	동물					Coleoptera	딱정벌레목	Chrysomelidae	잎벌레과	<i>Cryptocaphalus jeanus</i>	동물	검물기(검물기)
계룡산	고등균류	2020	동물					Hymenoptera	벌목	Argidae	종이벌레과	<i>Arga similis</i>	동물	검물기(검물기)

[그림 5] 검수를 위한 공원별 통계 및 세부항목 (예시)

- 정비한 보고서 한 권당 1개의 정형화된 파일을 생성하였고, 이는 총 20개의 엑셀 파일로 제출되어 레거시 데이터로 활용함

나. 1기 자연자원조사 입력검증

보고서 파일과 추출한 엑셀 파일과 비교를 위하여 데이터베이스에 저장된 항목을 역추출하였고, 검증을 위하여 작업자가 2번의 검수를 진행하였음

국립공원	조사분야	학명	명칭자	국명	국명_new	학명_new
가야산	곤충	Pedentonus	sp. 2			
가야산	곤충	Pedentonus	sp. 1			
가야산	곤충	Tachysphex bengalensis	Cameron	이리종물무영벌		
가야산	곤충	Astata (Astata) toops	Schrank	황부장벌		
가야산	곤충	Symmorphus captivus	(Sawth)	왕벌목살이강황벌		
가야산	곤충	Gomphus postocularis	Selys	머리줄검살자리		Shagomphus postocularis epophthalmus
가야산	곤충	Chrysema (Nisrodara) vigintipunctata	(Scopoli)	머리줄검살자리		
가야산	곤충	Smaragdina aurita	(Linne)	한남작살벌자리(목동박살벌자리)		
가야산	곤충	Deutonura binatubor	(Lee)	둥실물종물종기		Deutonura binatubor
가야산	곤충	Polonia hevaridosa	Lee	머리줄검살자리(검살자리)		Polonia hevaridosa
가야산	곤충	Entomobrya koreana	Yosa	고라할복종물종기		Entomobrya koreana
가야산	곤충	Homidia grisea	Lee et Lee	머리줄검살자리		Homidia grisea
가야산	곤충	Ameletus costalis	Matsuura	머리줄검살자리		Ameletus costalis
가야산	곤충	Ephemerella zigigata	Edson	부키리물살이		Ephemerella zigigata
가야산	곤충	Lyriothemis pachygnata	Selys	백지대검살자리		Lyriothemis pachygnata
가야산	곤충	Paragnetis flavidicta	(MacLachlan)	검살자리		Paragnetis flavidicta
가야산	곤충	Phaneroptera falcata	(Poda)	살배물자리		Phaneroptera falcata
가야산	곤충	Parasticticus ussuriensis	(Usakov)	검살자리		Parasticticus ussuriensis
가야산	곤충	Gastromargus marmoratus	(Thunberg)	물종기		Gastromargus marmoratus
가야산	곤충	Melythophus nebulosus	(Stephens)	다듬이벌레		Melythophus nebulosus
가야산	곤충	Nespa hoffmanni	Esaki	검살자리(검살자리)		Nespa hoffmanni
가야산	곤충	Nisotecta (Paranecta) triguttata	Motshulsky	송장왜물종기		Nisotecta (Paranecta) triguttata
가야산	곤충	Anoplophora malasiaca	(Thomson)	물참이벌레		Anoplophora malasiaca
가야산	곤충	Calopteryx nitata	Selys	검살자리(검살자리)		Calopteryx nitata
가야산	곤충	Cercion hieroglyphicum	(Baeser)	물물살자리		Cercion hieroglyphicum
가야산	곤충	Tomocerus (Tomocerna) violaceus	Yoshi	로라가시물종기		Tomocerus violaceus
가야산	곤충	Stelma (Stelma) cusnata	Brooks	머리줄검살자리		Stelma cusnata
가야산	곤충	Homidia bilineata	Lee et Park	머리줄검살자리		
가야산	곤충	Leptura arcuata	Panzer	긴발목물참이벌레(물참이벌레)		
가야산	곤충	Tomocerus viridis	Mulsant	머리줄검살자리		
가야산	곤충	Epiglenea comes	Bates	노랑물참이벌레		Epiglenea comes comes
가야산	곤충	Lema (Petauristes) adamsii	Baly	검발이관박살벌레		Lema (Petauristes) adamsii

[그림 6] 1기 전체 데이터(일부)

(1) 국가생물종 전환 작업 진행

- 국가종목목 기준으로 국명, 학명 기준으로 1기 데이터와 일치하는지 검사
- 일치하면 국가생물종 전환 작업을 함 (2019년 정보분석시스템과 동일작업)

(2) 데이터 정비 작업 진행 (공백 부분)

- 국명, 학명에 데이터에 공백이 없는지 확인을 함
- 공백이 있을 경우 공백을 제거 후 국가생물종 전환 작업을 진행
- 시스템에 해당 데이터의 통계를 확인 할 수 있도록 개발 진행

[그림 7] 분류군별 1기 데이터 통계 현황

2

현지조사표(1~3기) 자료 통합을 위한 DB 구조 재설계

가. 2019년 구축한 격자 데이터의 전환

▣ 대용량의 격자 데이터의 원활한 처리를 위하여 물리적으로 나뉜 테이블로 생성하여 각 국립공원 별로 파티션으로 분리하였고 논리적 결합이 된 파티션테이블로 전환함

(1) 파티션 테이블로 변경작업 진행 과정

- 파티션테이블 생성 작업 진행 (공원명 기준의 파티션 선언)
- 파티션테이블 전환 대상 : 10m,100m,1000m 격자

[테이블 DDL 1] national_point_p 테이블 DDL

```
CREATE TABLE common.national_point_p
(
  minx character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  miny character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  maxx character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  maxy character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  x_name character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  y_name character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  p_name character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  dem character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  geom geometry,
  dem_h character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  dem_v character varying(200) COLLATE pg_catalog."default"
) PARTITION BY LIST (p_name) ;

ALTER TABLE common.national_point_p
  OWNER to postgres;

CREATE INDEX geom_p
  ON common.national_point_p USING btree
  (geom ASC NULLS LAST)
  TABLESPACE pg_default;

CREATE INDEX point_max_p
  ON common.national_point_p USING btree
  (maxx COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST, maxy COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST)
  TABLESPACE pg_default;

CREATE INDEX point_park_name
  ON common.national_point_p USING btree
  (p_name COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST)
  TABLESPACE pg_default;

CREATE TABLE common.national_point_p_1 PARTITION OF common.national_point_p
  FOR VALUES IN ('북한산');

CREATE TABLE common.national_point_p_10 PARTITION OF common.national_point_p
```

```
FOR VALUES IN ('한려해상');

CREATE TABLE common.national_point_p_11 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('월악산');

CREATE TABLE common.national_point_p_12 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('치악산');

CREATE TABLE common.national_point_p_13 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('태안해안');

CREATE TABLE common.national_point_p_14 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('다도해_남부');

CREATE TABLE common.national_point_p_15 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('다도해_서부');

CREATE TABLE common.national_point_p_16 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('가야산');

CREATE TABLE common.national_point_p_17 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('소백산');

CREATE TABLE common.national_point_p_18 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('월출산');

CREATE TABLE common.national_point_p_19 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('주왕산');

CREATE TABLE common.national_point_p_2 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('설악산');

CREATE TABLE common.national_point_p_20 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('변산반도');

CREATE TABLE common.national_point_p_21 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('태백산');

CREATE TABLE common.national_point_p_22 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('무등산');

CREATE TABLE common.national_point_p_23 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('다도해해상');

CREATE TABLE common.national_point_p_24 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('경주');

CREATE TABLE common.national_point_p_3 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('한라산');

CREATE TABLE common.national_point_p_4 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('계룡산');

CREATE TABLE common.national_point_p_5 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('덕유산');

CREATE TABLE common.national_point_p_6 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('속리산');
```

```
CREATE TABLE common.national_point_p_7 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('지리산');
```

```
CREATE TABLE common.national_point_p_8 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('내장산');
```

```
CREATE TABLE common.national_point_p_9 PARTITION OF common.national_point_p
FOR VALUES IN ('오대산');
```

[테이블 DDL 2] national_point_p_100 테이블 DDL

```
CREATE TABLE common.national_point_p_100
(
  minx character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  miny character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  maxx character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  maxy character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  x_name character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  y_name character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  p_name character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  dem character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  geom geometry
) PARTITION BY LIST (p_name) ;

ALTER TABLE common.national_point_p_100
OWNER to postgres;

CREATE INDEX geom_p_100
ON common.national_point_p_100 USING btree
(geom ASC NULLS LAST)
TABLESPACE pg_default;

CREATE INDEX point_max_p_100
ON common.national_point_p_100 USING btree
(maxx COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST, maxy COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST)
TABLESPACE pg_default;

CREATE INDEX point_park_name_100
ON common.national_point_p_100 USING btree
(p_name COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST)
TABLESPACE pg_default;

CREATE TABLE common.np_p_100_1 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('북한산');

CREATE TABLE common.np_p_100_10 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('한려해상');

CREATE TABLE common.np_p_100_11 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('월악산');

CREATE TABLE common.np_p_100_12 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('치악산');

CREATE TABLE common.np_p_100_13 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('태안해안');

CREATE TABLE common.np_p_100_14 PARTITION OF common.national_point_p_100
```

```

FOR VALUES IN ('다도해_남부');

CREATE TABLE common.np_p_100_15 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('다도해_서부');

CREATE TABLE common.np_p_100_16 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('가야산');

CREATE TABLE common.np_p_100_17 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('소백산');

CREATE TABLE common.np_p_100_18 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('월출산');

CREATE TABLE common.np_p_100_19 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('주왕산');

CREATE TABLE common.np_p_100_2 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('설악산');

CREATE TABLE common.np_p_100_20 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('변산반도');

CREATE TABLE common.np_p_100_21 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('태백산');

CREATE TABLE common.np_p_100_22 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('무등산');

CREATE TABLE common.np_p_100_23 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('다도해해상');

CREATE TABLE common.np_p_100_24 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('경주');

CREATE TABLE common.np_p_100_3 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('한라산');

CREATE TABLE common.np_p_100_4 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('계룡산');

CREATE TABLE common.np_p_100_5 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('덕유산');

CREATE TABLE common.np_p_100_6 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('속리산');

CREATE TABLE common.np_p_100_7 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('지리산');

CREATE TABLE common.np_p_100_8 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('내장산');

CREATE TABLE common.np_p_100_9 PARTITION OF common.national_point_p_100
FOR VALUES IN ('오대산');

```

[테이블 DDL 3] national_point_p_1000 테이블 DDL

```

CREATE TABLE common.national_point_p_1000

```

```

(
  minx character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  miny character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  maxx character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  maxy character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  x_name character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  y_name character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  p_name character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  dem character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
  geom geometry
) PARTITION BY LIST (p_name) ;

ALTER TABLE common.national_point_p_1000
  OWNER to postgres;

CREATE INDEX geom_p_1000
  ON common.national_point_p_1000 USING btree
  (geom ASC NULLS LAST)
  TABLESPACE pg_default;

CREATE INDEX point_max_p_1000
  ON common.national_point_p_1000 USING btree
  (maxx COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST, maxy COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST)
  TABLESPACE pg_default;

CREATE INDEX point_park_name_1000
  ON common.national_point_p_1000 USING btree
  (p_name COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST)
  TABLESPACE pg_default;

CREATE TABLE common.np_p_1000_1 PARTITION OF common.national_point_p_1000
  FOR VALUES IN ('북한산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_10 PARTITION OF common.national_point_p_1000
  FOR VALUES IN ('한려해상');

CREATE TABLE common.np_p_1000_11 PARTITION OF common.national_point_p_1000
  FOR VALUES IN ('월악산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_12 PARTITION OF common.national_point_p_1000
  FOR VALUES IN ('치악산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_13 PARTITION OF common.national_point_p_1000
  FOR VALUES IN ('태안해안');

CREATE TABLE common.np_p_1000_14 PARTITION OF common.national_point_p_1000
  FOR VALUES IN ('다도해_남부');

CREATE TABLE common.np_p_1000_15 PARTITION OF common.national_point_p_1000
  FOR VALUES IN ('다도해_서부');

CREATE TABLE common.np_p_1000_16 PARTITION OF common.national_point_p_1000
  FOR VALUES IN ('가야산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_17 PARTITION OF common.national_point_p_1000
  FOR VALUES IN ('소백산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_18 PARTITION OF common.national_point_p_1000
  FOR VALUES IN ('월출산');

```

```
CREATE TABLE common.np_p_1000_19 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('주왕산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_2 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('설악산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_20 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('변산반도');

CREATE TABLE common.np_p_1000_21 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('태백산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_22 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('무등산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_23 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('다도해해상');

CREATE TABLE common.np_p_1000_24 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('경주');

CREATE TABLE common.np_p_1000_3 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('한라산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_4 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('계룡산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_5 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('덕유산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_6 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('속리산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_7 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('지리산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_8 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('내장산');

CREATE TABLE common.np_p_1000_9 PARTITION OF common.national_point_p_1000
FOR VALUES IN ('오대산');
```

(2) PGADMIN의 데이터베이스 구조

[그림 8] national_point_p 파티션 테이블 목록

[그림 9] national_point_p_100 파티션 테이블 목록

[그림 10] national_point_p_1000 파티션 테이블 목록

(3) 격자데이터 마이그레이션 진행(10m격자)

- 신규 생성 프로그램을 통해 직행함. (덤프 파일을 통한 DB 마이그레이션 불가)
- 서브 프로그램인 국가지점번호생성 프로그램을 이용하여 10m격자데이터 입력을 진행함

MaxX	MaxY	MinX	MinY	국가지점번호
700010	1300010	700000	1300000	가가 0000 0000
700010	1300020	700000	1300010	가가 0000 0001
700010	1300030	700000	1300020	가가 0000 0002
700010	1300040	700000	1300030	가가 0000 0003
700010	1300050	700000	1300040	가가 0000 0004
700010	1300060	700000	1300050	가가 0000 0005
700010	1300070	700000	1300060	가가 0000 0006
700010	1300080	700000	1300070	가가 0000 0007
700010	1300090	700000	1300080	가가 0000 0008
700010	1300100	700000	1300090	가가 0000 0009
700010	1300110	700000	1300100	가가 0000 0010
700010	1300120	700000	1300110	가가 0000 0011
700010	1300130	700000	1300120	가가 0000 0012
700010	1300140	700000	1300130	가가 0000 0013
700010	1300150	700000	1300140	가가 0000 0014
700010	1300160	700000	1300150	가가 0000 0015
700010	1300170	700000	1300160	가가 0000 0016
700010	1300180	700000	1300170	가가 0000 0017
700010	1300190	700000	1300180	가가 0000 0018
700010	1300200	700000	1300190	가가 0000 0019
700010	1300210	700000	1300200	가가 0000 0020
700010	1300220	700000	1300210	가가 0000 0021
700010	1300230	700000	1300220	가가 0000 0022
700010	1300240	700000	1300230	가가 0000 0023
700010	1300250	700000	1300240	가가 0000 0024
700010	1300260	700000	1300250	가가 0000 0025
700010	1300270	700000	1300260	가가 0000 0026
700010	1300280	700000	1300270	가가 0000 0027
700010	1300290	700000	1300280	가가 0000 0028

[그림 11] 10m 격자데이터 입력에 해당하는 리스트(예시)

- 생성된 파일을 Bulk Insert 기법을 통해 데이터베이스에 입력함

나. 2·3기 공원지원 보고서 비교를 위한 통계자료 추출

▣ 데이터베이스에서 1기부터 4기까지 각 국립공원 별로 국가생물종 전환 전과 국가생물종 전환 후 통계를 1기~4기_통계비교자료.xlsx에 저장을 하며, 국가 생물종 전환전 상세 데이터는 통계세부내역 폴더에 각 국립공원별로 저장을 진행함

(1) 조사원본 기반 통계

- 1기~4기 국가생물종으로 전환 전 데이터와 전환 후 데이터합계를 국립공원별로 통계를 작성함

국가생물종 전환 전																						
2기	지리산	계룡산	한려해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안해안	다도해해상	지악산	둘락산	북한산	소백산	물줄산	변산반도	경주	무등산	원라산	태백산
조사_거미	0	0	234	0	0	167	199	0	103	139	100	251	101	122	0	148	0	0	0	0	0	0
조사_경성저서무척추	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	58	90	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0
조사_고등곤류	0	214	0	0	252	281	22	426	244	210	179	128	493	70	0	157	155	226	226	0	0	0
조사_곤충	362	626	473	0	273	362	445	1250	980	432	21	1283	641	740	0	923	385	564	446	0	0	0
조사_담수어류	0	17	20	45	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_담수조류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	216	0	145	0	139	89	173	223	0	0	0
조사_동물플랑크톤	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
조사_식물상	750	470	669	0	643	576	368	767	646	562	446	1453	686	622	0	734	0	0	752	0	0	0
조사_식물플랑크톤	0	0	121	0	0	0	151	0	0	0	54	135	93	0	0	0	0	56	0	0	0	0
조사_식생	0	0	0	0	0	0	0	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_야고산대식물상	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_양서류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_양서파충류	21	16	0	0	15	23	0	18	17	19	0	0	0	15	0	15	0	17	21	0	0	0
조사_어류	44	0	0	0	28	29	0	22	19	16	0	104	22	27	0	33	18	30	32	0	0	0
조사_연성저서무척추	0	0	273	0	0	0	0	0	0	0	161	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_면제동물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_저서성대형무척추동물	119	0	113	75	76	65	77	72	0	99	0	119	84	110	0	93	94	65	99	0	0	0
조사_절지동물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_조류	68	38	70	0	81	68	61	80	48	83	0	246	116	68	0	77	74	0	112	0	0	0
조사_진정거미	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	119	115	0	0	0
조사_특정저서무척추	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_파충류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_포유류	15	17	0	0	15	0	22	22	18	25	0	34	0	13	0	13	21	12	22	0	0	0
조사_해양어류	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_해조류	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	169	95	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
조사_해조류	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_환형동물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[그림 12] 국가생물종 전환 전 통계(2기)

- 1기~4기 국가생물종으로 전환 전 세부내역 데이터를 뽑아서 각 국립공원별로 정리를 함

조사분야	원본국명	원본학명	분류군_new	국명_new	국명_new
조사_담수어류	기름종개	Cobitis hankuensis	어류	기름종개	Cobitis hankuensis
조사_담수어류	긴물개	Squalius gracilis majimae	어류	긴물개	Squalius gracilis majimae
조사_담수어류	꼭지	Coreoperca herzi	어류	꼭지	Coreoperca herzi
조사_담수어류	뿔고기	Pungtungia herzi	어류	뿔고기	Pungtungia herzi
조사_담수어류	물고기	Microphysogobio yaluensis	어류	물고기	Microphysogobio yaluensis
조사_담수어류	뽕사리	Odontobutis platycephala	어류	뽕사리	Odontobutis platycephala
조사_담수어류	모래두지	Pseudogobio esocinus	어류	모래두지	Pseudogobio esocinus
조사_담수어류	미꾸라지	Misgurnus mizolepis	어류	미꾸라지	Misgurnus mizolepis
조사_담수어류	미꾸리	Misgurnus anguillicaudatus	어류	미꾸리	Misgurnus anguillicaudatus
조사_담수어류	미유기	Silurus microdorsalis	어류	미유기	Silurus microdorsalis
조사_담수어류	벼물기	Rhynchocypris corecephalus	어류	벼물기	Rhynchocypris corecephalus
조사_담수어류	수수미꾸리	Kichulchoia multifasciata	어류	수수미꾸리	Kichulchoia multifasciata
조사_담수어류	쉬리	Coreoleuciscus splendidus	어류	쉬리	Coreoleuciscus splendidus
조사_담수어류	알록새코미꾸리	Koreocobitis naktongensis	어류	알록새코미꾸리	Koreocobitis naktongensis
조사_담수어류	자가사리	Liobagrus mediadiposalis	어류	자가사리	Liobagrus mediadiposalis
조사_담수어류	황갈고니	Blank			
조사_담수어류	장갈고니	Zacco koreanus	어류	장갈고니	Zacco koreanus
조사_담수어류	피라미	Zacco platypus	어류	피라미	Zacco platypus
조사_식물물장크론	Achnanthes alteragracilima	Achnanthes alteragracilima	물알류	Achnanthes alteragracilima	Achnanthes alteragracilima
조사_식물물장크론	Achnanthes convergens	Achnanthes convergens	물알류	Achnanthes convergens	Achnanthes convergens
조사_식물물장크론	Achnanthes hungarica	Achnanthes hungarica	물알류	Achnanthes hungarica	Achnanthes hungarica
조사_식물물장크론	Achnanthes lanceolata	Achnanthes lanceolata	물알류	Achnanthes lanceolata	Achnanthes lanceolata
조사_식물물장크론	Achnanthes lapidosa	Achnanthes lapidosa	물알류	Achnanthes lapidosa	Achnanthes lapidosa
조사_식물물장크론	Achnanthes laterostrata	Achnanthes laterostrata	물알류	Achnanthes laterostrata	Achnanthes laterostrata
조사_식물물장크론	Achnanthes minutissima	Achnanthes minutissima	물알류	Achnanthes minutissima	Achnanthes minutissima
조사_식물물장크론	Achnanthes minutissima var. scotia	Achnanthes minutissima var. scotia			
조사_식물물장크론	Achnanthes saxonia	Achnanthes saxonia			
조사_식물물장크론	Achnanthes sp	Achnanthes sp			
조사_식물물장크론	Achnanthes subhudsonis	Achnanthes subhudsonis	물알류	Achnanthes subhudsonis	Achnanthes subhudsonis

[그림 13] 국가생물종 전환 전 세부내역(2기 가야산)

(2) 국가생물종기반 기반 통계

- 1기~4기 국가생물종으로 전환 후 데이터 개수를 국립공원별로 통계를 작성함

국가생물종 전환 후 2기	지리산	계룡산	한려해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안해안	다도해해상	지악산	칠악산	북한산	소백산	월출산	연성반도	경주	무릉산	함라산	태백산
조사_거미	0	0	167	0	0	164	168	0	105	106	80	140	93	111	0	122	0	0	0	0	0	0
조사_경성저서투척주	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	34	70	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
조사_고등곤류	109	193	119	0	230	253	19	385	188	169	114	106	247	68	0	109	128	191	153	0	0	0
조사_곤충	355	617	565	0	271	354	395	1219	968	345	394	693	609	719	0	882	445	529	382	0	0	0
조사_담수어류	0	17	19	45	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_담수조류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	129	0	103	0	81	63	123	154	0	0	0
조사_물물장크론	0	0	20	0	0	0	0	0	0	12	0	37	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
조사_식물상	486	462	412	0	623	564	359	739	630	512	402	1228	666	608	0	702	391	217	650	0	0	0
조사_식물물장크론	0	0	58	0	0	0	98	0	0	0	18	85	75	0	0	0	0	22	0	0	0	0
조사_식생	203	157	0	0	292	144	123	263	250	0	0	0	203	0	0	284	0	0	0	0	0	0
조사_아교산대식물상	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_왕새류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_왕새파충류	20	16	17	0	15	22	16	17	17	19	17	19	16	15	0	15	14	17	21	0	0	0
조사_어류	31	0	0	0	27	24	0	21	19	16	0	100	21	27	0	32	18	29	32	0	0	0
조사_연성저서투척주	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	88	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_연성동물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_저서생대형무척추동물	76	0	55	60	62	50	52	55	0	62	0	84	62	77	0	67	56	44	61	0	0	0
조사_물지충류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_포류	67	38	70	0	80	66	59	78	48	72	102	190	115	67	0	76	73	95	109	0	0	0
조사_진정거미	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	96	82	0	0
조사_복정저서투척주	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_과충류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_포충류	21	14	13	0	15	14	19	19	18	22	11	19	17	13	0	14	20	11	19	0	0	0
조사_헤파어류	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_헤파류	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	101	68	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
조사_헤파류	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사_관형동물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[그림 14] 국가생물종 전환 후 통계(2기)

(3) 2기, 3기 자연자원조사 보고서 및 현지조사표의 비교 작업 진행(2019년 자연자원조사 대상지)

- 대상 : 북한산(3기), 속리산, 지리산, 한려해상
- 시스템에서 2기와 3기 데이터의 목록을 추출하여 공원별 엑셀을 제작함
- 제작된 엑셀을 기반으로 하여 수작업으로 보고서와 비교를 진행함
- 비교 시 엑셀의 목록이 보고서에 존재하면 O를 추가함
- 보고서의 내용이 엑셀에 없을 시 별도 기재함
- 현지조사표에만 있는 내용, 보고서에만 있는 내용, 모두 같이 있는 내용등을 작성함

2. 현지조사표(1~3기) 자료 통합을 위한 DB 구조 재설계

조사분야	국명	학명	보고서 존재	보고서에만 존재 (학명)	보고서에만 존재 (국명)
조사_고등균류		<i>Iledictyon gracile</i>		<i>Lycopodium obscurum</i> L.	만년속성
조사_고등균류		<i>Lactarius muteus</i>	o	<i>E. ramosissimum</i> DESF	개속새
조사_고등균류		<i>Suillus laricinus</i>		<i>Cheilanthes argentea</i> KUNZE	부싯깃고사리
조사_고등균류	가는아교고약버섯	<i>Phlebia rufa</i>	o	<i>Athyrium acutipinnulum</i> Kodama	섬고사리
조사_고등균류	가랑잎애기버섯	<i>Marasmius urens</i>	o	<i>A. brevifrons</i> Nakai	참새발고사리
조사_고등균류	가지버섯			<i>A. henryi</i> DIELS	곱새고사리
조사_고등균류	가지진흙버섯	<i>Phellinus laevigatus</i>	o	<i>A. pycnosorum</i> H. CHRIST	털고사리
조사_고등균류	각목버섯	<i>Rigidoporus microporus</i>	o	<i>Dryopteris saxifraga</i> H. Ito	바위족제비고사리
조사_고등균류	갈색고리갓버섯	<i>Lepiota cristata</i>	o	<i>D. lacera</i> O. KUNTZE	비늘고사리
조사_고등균류	갈색꽃구름버섯	<i>Stereum ostrea</i>	o	<i>D. uniformi</i> (Mak.) Makino	곰비늘고사리
조사_고등균류	갈색주름버섯			<i>D. monticola</i> C. CHRIST	왕지네고사리
조사_고등균류	갈색털꽃구름버섯	<i>Stereum subtomentosum</i>	o	<i>Lastrea thelypteris</i> (L.) BORY	처녀고사리
조사_고등균류	갓버섯속			<i>Phegopteris polypodioides</i> FEE	가래고사리
조사_고등균류	갓소나무껍질버섯	<i>Hydnochaete tabacinoides</i>	o	<i>Rumohra miqueliana</i> CHING	와살고사리
조사_고등균류	검은띠말뚝버섯	<i>Panaeolus cinctulus</i>	o	<i>Woodsia manchuriensi</i> HOOKER	만주우드풀
조사_고등균류	검은외대버섯	<i>Entoloma ater</i>	o	<i>Lepisorus onoei</i> CHING	애기일엽초
조사_고등균류	검은혹버섯			<i>L. thunbergianus</i> CHING	일엽초
조사_고등균류	겨울구멍장이버섯	<i>Polyporus brumalis</i>	o	<i>Pyrrosia linearifolia</i> CHING	우단일엽
조사_고등균류	광대버섯 속			<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	네가래
조사_고등균류	광대버섯속(녹황색)			<i>Salvinia natans</i> (L.) ALL.	생이가래
조사_고등균류	구름버섯	<i>Trametes versicolor</i>	o	<i>C. koreana</i> var. <i>nana</i> NAKAI	눈개비자나무
조사_고등균류	구멍장이버섯	<i>Polyporus squamosus</i>		<i>Taxus cuspidata</i> S. et Z.	주목
조사_고등균류	구멍장이속			<i>Abies holophylla</i> MAX.	젓나무
조사_고등균류	국수버섯	<i>Clavaria fragilis</i>	o	<i>A. nephrolepi</i> MAX.	분비나무
조사_고등균류	굴털이	<i>Lactarius piperatus</i>		<i>Picea abies</i> (L.) KARST.	독일가문비
조사_고등균류	굴털이버섯			<i>Juniperus chinensi</i> L	향나무
조사_고등균류	굽두더기버섯			<i>Thuja orientali</i> L.	축백나무
조사_고등균류	그물구멍버섯	<i>Ceriporia viridans</i>	o	<i>Populus euramericana</i> GUINIER	이태리포플러
조사_고등균류	그물버섯속			<i>P. nigra</i> var. <i>italica</i> (MUENCH.) KOEHNE	양버들
조사_고등균류	그물주름구멍버섯	<i>Daedalea heteromorpha</i>	o	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura	왕버들
조사_고등균류	그물코버섯	<i>Porodisculus pendulus</i>	o	<i>S. matsudana</i> for. <i>tortuosa</i> REHDER	웅버들
조사_고등균류	금빛시루뻨버섯	<i>Cryptoderma citrinum</i>	o	<i>S. nipponica</i> FR. et SAV.	선버들
조사_고등균류	금빛흰구멍버섯	<i>Perenniporia subacida</i>	o	<i>S. xerophila</i> for. <i>glabra</i> (Nak.) Kitagawa	유가래나무
조사_고등균류	기계충버섯	<i>Irpex lacteus</i>	o	<i>J. s. nensi</i> DODE	호두나무

[그림 15] 2기 보고서와 현지조사표 비교 예시

- 4개 공원, 2기~3기 데이터 총 17,346 건에 대한 비교 작업 완료

다. 2·3기 불필요컬럼 정비

Ⅱ 2·3기 테이블에 있는 각 컬럼 존재하는 데이터 개수와 전체 데이터 개수를 통계를 내어 2기3기테이블현황.xlsx 파일에 저장

(1) 현황 자료

- 2·3기 테이블에 있는 각 컬럼 존재하는 데이터 개수와 전체 데이터 개수를 통계를 내어 작성함.
- 2·3기 각 테이블에 있는 중복된 컬럼들의 데이터 개수를 합쳐서 통계 내어 작성함.

tbl_nm	attr_nm	컬럼현황				tbl_nm	attr_nm	존재	전체	%
		존재	전체	%						
조사_거미	key	23942	23942	100.0%	key		546049	546049	100.0%	
조사_거미	key_new	0	23942	0.0%	key_new		361	546049	0.1%	
조사_거미	no	6405	23942	26.8%	no		201787	541126	37.3%	
조사_거미	number_new	15539	23942	64.9%	number_new		418651	546049	76.7%	
조사_거미	number_new_real	15140	23942	63.2%	number_new_real		371449	546049	68.0%	
조사_거미	year_new	22943	23942	95.8%	year_new		542984	546049	99.4%	
조사_거미	강우량	15424	23942	64.4%	강우량		256201	513988	49.8%	
조사_거미	개체수	17103	23942	71.4%	개체수		443819	544677	81.5%	
조사_거미	격자	1565	23942	6.5%	격자		35934	428366	8.4%	
조사_거미	격자_new	14957	23942	62.5%	격자_new		14957	23942	62.5%	
조사_거미	격자번호	11905	23942	49.7%	격자번호		328068	546049	60.1%	
조사_거미	격자번호_new	19518	23942	81.5%	격자번호_new		428018	546049	78.4%	
조사_거미	경도	23942	23942	100.0%	경도		545725	546049	99.9%	
조사_거미	경도_new	22882	23942	95.6%	경도_new		515853	546049	94.5%	
조사_거미	고도	18765	23942	78.4%	고도		306881	545971	56.2%	
조사_거미	고도_new	22696	23942	94.8%	고도_new		442861	546049	81.1%	
조사_거미	고유종	9588	23942	40.0%	고유종		45539	347177	13.1%	
조사_거미	공원_new	23942	23942	100.0%	공원_new		546049	546049	100.0%	
조사_거미	과명	6839	23942	28.6%	과명		37508	174067	21.5%	
조사_거미	과제명	18876	23942	78.8%	과제명		382066	546049	70.0%	
조사_거미	구분	10472	23942	43.7%	구분		289739	544599	53.2%	
조사_거미	국가생물종전환	0	23942	0.0%	국가생물종전환		0	546049	0.0%	
조사_거미	국립공원	14824	23942	61.9%	국립공원		356269	544124	65.5%	
조사_거미	국명	23942	23942	100.0%	국명		540472	546049	99.0%	
조사_거미	국명_new	22038	23942	92.0%	국명_new		484747	546049	88.8%	
조사_거미	국외반출승인대상종	1565	23942	6.5%	국외반출승인대상종		17873	336300	5.3%	
조사_거미	기_new	23942	23942	100.0%	기_new		546049	546049	100.0%	
조사_거미	날씨	19319	23942	80.7%	날씨		364816	546049	66.8%	
조사_거미	도구및방법	0	23942	0.0%	도구및방법		379	25384	1.5%	
조사_거미	리_new	19555	23942	81.7%	리_new		424785	546049	77.8%	

[그림 16] 2·3기 테이블 컬럼 통계(일부)

(2) 데이터 정비

- 해당 표를 기반으로 시스템에 활용되는 데이터를 정비 진행함

3

공원자원조사 정보분석시스템 데이터베이스 탑재

가. 1기 데이터 DB화 진행

1기 데이터 입력현황.xlsx에 있는 데이터들을 테이블(research1)에 import하여 1기 데이터 DB화

(1) 테이블 구성도

[표 1] 1기 자연자원조사 테이블 구성도

테이블	컬럼	데이터 타입
research1	학명	character varying(200)
research1	명명자	character varying(200)
research1	국명	character varying(200)
research1	국명_new	character varying(200)
research1	학명_new	character varying(200)
research1	분류군_new	character varying(200)
research1	key	character varying(200)
research1	기_new	character varying(200)
research1	공원_new	character varying(200)
research1	통계제외	character varying(200)
research1	오류승인	character varying(200)
research1	국립공원	character varying(200)
research1	조사분야	character varying(200)
research1	Family	character varying(200)
research1	과	character varying(200)

[테이블 DDL 4] research1 테이블 DDL

```
CREATE TABLE real_data.research1
(
    "국립공원" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "조사분야" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "Family" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "과" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "학명" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "명명자" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "국명" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "국명_new" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "학명_new" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "분류군_new" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    key character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "기_new" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "공원_new" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "통계제외" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default",
    "오류승인" character varying(200) COLLATE pg_catalog."default"
)

TABLESPACE pg_default;

ALTER TABLE real_data.research1
    OWNER to postgres;

CREATE INDEX "research1_국립공원_idx"
    ON real_data.research1 USING btree
    ("국립공원" COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST)
    TABLESPACE pg_default;

CREATE INDEX "research1_국립공원_학명_idx"
    ON real_data.research1 USING btree
    ("국립공원" COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST, "학명" COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST)
    TABLESPACE pg_default;

CREATE INDEX "research1_국립공원_학명_new_idx"
    ON real_data.research1 USING btree
    ("국립공원" COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST, "학명_new" COLLATE pg_catalog."default" ASC NULLS LAST)
    TABLESPACE pg_default;
```

나. 1기 데이터 시스템 로딩

1기 데이터의 CSV를 제작하여 데이터베이스 관리 툴인 PGADMIN의 Import 기능을 통하여 데이터베이스 탑재

(1) 1기 데이터 저장

국립공원	조사분야	학명	명명자	국명
가야산	곤충	Promethis	sp.	
가야산	곤충	Massicus raddei	(Blessig)	하늘소
가야산	곤충	Lethe amrginalis	(Motschulsky)	먹그늘나비붙이
가야산	곤충	Erebia epimenides	(Menetries)	알락그늘나비
가야산	곤충	Speyeria aglaja	(Linne)	풀표범나비
가야산	곤충	Sephisa prineceps	(Fixsen)	대왕나비
가야산	곤충	Limenitis helamnni	Lederer	제일출나비
가야산	곤충	Hestina japonica	(C. et R. Felder)	흑백알락나비
가야산	곤충	Fabriciana adippe	(Linne)	긴은점표범나비
가야산	곤충	Clossiana oscarus	(Evermann)	큰은점선표범나비
가야산	곤충	Argyronome ruslana	(Motschulsky)	큰흰줄표범나비
가야산	곤충	Argyronome laodice	(Pallas)	흰줄표범나비
가야산	곤충	Libythea celtis	Fuessly	뿔나비
가야산	곤충	Lycaeides argyronomon	(Bergstrasser)	부전나비
가야산	곤충	Lobella daeana	Lee	대아귀염무늬톡토기
가야산	곤충	Entomobrya striatella	Borner	줄털보톡토기
가야산	곤충	Calopteryx japonica	Selys	물잠자리
가야산	곤충	Anisogomphus maacki	(Selys)	마이키축범잠자리
가야산	곤충	Alloeotomus chinensis	Reuter	소나무장님노린재
가야산	곤충	Adelphocoris triannulatus	(Stal)	설상무늬장님노린재
가야산	곤충	Eolygus rubrolineatus	(Matsumura)	홍출장님노린재
가야산	곤충	Velinus nodipes	(Uhler)	겹적침노린재
가야산	곤충	Gastrodes grossipes japonicus	(Stal)	넓적긴노린재
가야산	곤충	Pinthaeus sanguinipes	(Fabricius)	홍다리주둥이노린재
가야산	곤충	Pentheria japonica	Wiedmann	계피우단털파리
가야산	곤충	Solva maculata	Meigen	얼룩점말들이파리매
가야산	곤충	Eurema hecabe	(Linne)	남방노랑나비
가야산	곤충	Lugyra similis	Coquillett	뺨은큰재니등에
가야산	곤충	Mesorhaga nebulosa	(Matsumura)	얼룩장다리파리
가야산	곤충	Promachus yesonicus	Bigot	파리매
가야산	곤충	Eristalis (Eristalis) tenax	(Linne)	꽃등에
가야산	곤충	Microdon oitanmus	Shiraki	왕개미꽃등에
가야산	곤충	Physocephala obscura	Matsumura	왕벌붙이파리
가야산	곤충	Aldrichina grahami	(Aldrich)	털검정파리

[그림 17] 데이터 저장을 위한 CSV 파일 예시

다. 1기 데이터 시스템 반영

데이터베이스에 들어가 있는 1기 데이터들은 국립공원, 조사 분야에 해당하는 데이터들이 출력되며 통계 만들기 및 검수하기를 하면 카운트를 출력

(1) 시스템 검수 및 조회 기능

- 시스템 검수에 대한 기능은 전체, 국명 비매칭, 학명 비매칭, 공원경계 비매칭 카운트가 되며, 해당 검수를 클릭하면 해당하는 데이터들을 출력

구분	출수
전체	1230
국명 비매칭	134
학명 비매칭	604
공원경계 비매칭	0
공원경지 비매칭	

구분	출수
통계 만들기	검수하기
분류 체계	집계
분류군	1
목	1
강	3
목	20
과	178
종	1103

국립공원	조사분야	국명	학명	분류군_new	국명_new	학명_new	KEY	ID
가야산	가야산	관중	꼬마형살벌	Polistes japonicus jap...	관중류	꼬마형살벌	Polistes japonicus jap...	가야산 0
가야산	가야산	관중	관중날개허투살이	Ameletus costalis	관중류	관중날개허투살이	Ameletus costalis	가야산 26
가야산	가야산	관중	백치레잠자리	Lynothemis pechygastra	관중류	백치레잠자리	Lynothemis pechygastra	가야산 28
가야산	가야산	관중	관중가시꽃파리	Megophya multisetosa	관중류	관중가시꽃파리	Megophya multisetosa	가야산 40
가야산	가야산	관중	송알꽃파리	Dichaetomyia japonica	관중류	송알꽃파리	Dichaetomyia japonica	가야산 41
가야산	가야산	관중	수물다리반나방	Paralitia stiposa	관중류	수물다리반나방	Paralitia stiposa	가야산 53
가야산	가야산	관중	미아키속잠자리	Anisogomphus maacki	관중류	미아키속잠자리	Anisogomphus maacki	가야산 58
가야산	가야산	관중	수물꽃초기	Homidia bilineata				가야산 66
가야산	가야산	관중		Pedetontus				가야산 67
가야산	가야산	관중		Pedetontus				가야산 68
가야산	가야산	관중		Pedetontus				가야산 69
가야산	가야산	관중		Pedetontus				가야산 70
가야산	가야산	관중	꼬마허투살이	Beetis thomicus				가야산 71
가야산	가야산	관중	꼬마허투살이	Ecdyonurus				가야산 72
가야산	가야산	관중	관중꼬리허투살이	Epeorus (Epeorus) cur...				가야산 73
가야산	가야산	관중	세줄범색허투살이	Chorotepes trifurcata				가야산 74
가야산	가야산	관중	일줄왕잠자리	Drumella cryptomena				가야산 75
가야산	가야산	관중	메귀유리미	Scappispedus mandibularis				가야산 80

[그림 18] 1기 시스템 검수(가야산)

- 통계에 대한 기능은 분류군, 문, 강, 목, 과, 종이 카운트가 되며, 해당 통계를 클릭하면 해당 하는 리스트가 알림 창으로 출력

[그림 19] 1기 통계 기능(가야산)

(2) 통계 기능

- 통계에 대한 기능은 분류군 기준으로 카운트가 되며, 리스트와 통계표로 출력

[그림 20] 1기 분류군 통계

[그림 21] 1기 공원별 통계

- 통계에 대한 기능은 국립공원 기준으로 카운트가 되며, 리스트와 통계표로 출력

4 4기 보고서 비교

가. 4기 데이터 입력 현황

| 보고서와 데이터베이스에 들어간 데이터들이 존재하는지 서로 비교하여 각 국립공원 엑셀 파일에 정리 하였으며, 국립공원별로 통계 비교를 하여 통계 및 상세자료 저장

(1) 조사분야별 4기 출력

- 4기는 각 조사 분야별로 테이블 안에 데이터들이 저장이 되어있으며, 중복된 데이터 제외한 리스트를 출력

국립공원	국명	학명	국명_new	학명_new
북한산	가는잎그늘사초	Carex humilis var. nana	가는잎그늘사초	Carex humilis var. nana
북한산	가는잎족제비고사리	Dryopteris chinensis	가는잎족제비고사리	Dryopteris chinensis
북한산	가는장구채	Silene seoulensis	가는장구채	Silene seoulensis
북한산	가래	Potamogeton distinctus	가래	Potamogeton distinctus
북한산	가래나무	Juglans mandshurica	가래나무	Juglans mandshurica
북한산	가막사리	Bidens tripartita	가막사리	Bidens tripartita
북한산	가시파대가리	Kyllinga brevifolia	가시파대가리	Kyllinga brevifolia
북한산	가을강아지풀	Setaria faberi	가을강아지풀	Setaria faberi
북한산	가중나무	Ailanthus altissima	가중나무	Ailanthus altissima
북한산	갈대	Phragmites communis	갈대	Phragmites communis
북한산	갈참나무	Quercus aliena	갈참나무	Quercus aliena
북한산	갈퀴꼭두선이	Rubia cordifolia var. pratensis	갈퀴꼭두선이	Rubia cordifolia var. pratensis
북한산	갈퀴덩굴	Galium spurium var. echinospermum	갈퀴덩굴	Galium spurium var. echinospermum
북한산	갈풀	Phalaris arundinacea	갈풀	Phalaris arundinacea
북한산	감자개발나물	Sium ninsi	감자개발나물	Sium ninsi
북한산	강아지풀	Setaria viridis	강아지풀	Setaria viridis
북한산	개갈퀴	Asperula maximowiczii	개갈퀴	Asperula maximowiczii
북한산	개갓냉이	Rorippa indica	개갓냉이	Rorippa indica
북한산	개구리밥	Spirodela polyrhiza	개구리밥	Spirodela polyrhiza
북한산	개기장	Panicum bisulcatum	개기장	Panicum bisulcatum
북한산	개나리	Forsythia koreana	개나리	Forsythia koreana
북한산	개망초	Erigeron annuus	개망초	Erigeron annuus
북한산	개맥문동	Liriope spicata	개맥문동	Liriope spicata
북한산	개머루	Ampelopsis brevipedunculata	개머루	Ampelopsis brevipedunculata

[그림 22] 4기 조사분야(식물상) 파일 예시

(2) 4기 자연자원조사 보고서 및 현지조사표의 비교 작업 진행

- 대상 : 북한산, 속리산, 지리산, 한려해상
- 시스템에서 4기 데이터의 목록을 추출하여 공원별 엑셀을 제작
- 제작된 엑셀을 기반으로 하여 수작업으로 보고서와 비교를 진행
- 비교 시 엑셀의 목록이 보고서에 존재하면 O를 추가
- 보고서의 내용이 엑셀에 없을 시 별도 기재
- 현지조사표에만 있는 내용, 보고서에만 있는 내용, 모두 같이 있는 내용 등을 작성

조사표이	국명	학명	국명_new	학명_new	보고서 존재	보고서에만 존재 (학명)	보고서에만 존재 (국명)	보고서 존재여부(Total)	보고서에만 존재하는 것(Total)
식물상	가는잎그늘사초	Carex humilis var. nana	가는잎그늘사초	Carex humilis var. nana	o	Ricinus communis L.	피마자	1996	1805
식물상	가는잎죽제비고사리	Dryopteris chinensis	가는잎죽제비고사리	Dryopteris chinensis	o	Agropyron repens (L.) P. Beauv.	구주개밀		
식물상	가는장구재	Silene seoulensis	가는장구재	Silene seoulensis	o	Aconitum ciliare DC.	선암꽃바꽃		
식물상	가래	Potamogeton distinctus	가래	Potamogeton distinctus	o	Platanus orientalis (Makino) T. Yamanaka	버즘나무		
식물상	가래나무	Juglans mandshurica	가래나무	Juglans mandshurica	o	Berberis amurensis Rupr.	메밀꽃나무		
식물상	가막사리	Bidens tripartita	가막사리	Bidens tripartita	o	Tephrosia kirilowii (Turcz. ex DC.) Holub	송향덩이		
식물상	가시과대가리	Kyllinga brevifolia	가시과대가리	Kyllinga brevifolia	o	Torilis japonica (Houtt.) DC.	사상자		
식물상	가을강아지풀	Setaria faberii	가을강아지풀	Setaria faberii	o	Artemisia fiddis H. L'v. & Vaniot	황옥		
식물상	가을나무	Ailanthus altissima	가을나무	Ailanthus altissima	o	Rodgersia podophylla A. Gray	도깨비부채		
식물상	갈대	Phragmites communis	갈대	Phragmites communis	o	Arisaema amurense f. serratum (Nakai) Kitag.	전남성		
식물상	갈참나무	Quercus aliena	갈참나무	Quercus aliena	o	Corylus sieboldiana Blume	참개암나무		
식물상	갈퀴꼭두선이	Rubia cordifolia var. pratensis	갈퀴꼭두선이	Rubia cordifolia var. pratensis	o	Lilium distichum Nakai	말나리		
식물상	갈퀴덩굴	Galium spurium var. echinospermum	갈퀴덩굴	Galium spurium var. echinospermum	o	Coryza sumatrensis (Retz.) E. Walker	큰알초		
식물상	갈참	Phalaris arundinacea	갈참	Phalaris arundinacea	o	Cuscuta pentagona Engelm.	미국심새삼		
식물상	관자개발나물	Sium ninsi	관자개발나물	Sium ninsi	o	Corydalis pallida (Thunb.) Pers.	관홍주머니		
식물상	관아지풀	Setaria viridis	관아지풀	Setaria viridis	o	Pulsatilla cernua var. koreana (Yabe) Y. N. Lee	활미꽃		
식물상	개갈퀴	Asperula maximowiczii	개갈퀴	Asperula maximowiczii	o	Symplocarpus renifolius Schott ex Tzvelev	알은부채		
식물상	개갯냉이	Rorippa indica	개갯냉이	Rorippa indica	o	Rhododendron indicum (L.) Sweet	영산홍		
식물상	개구리밥	Spirodela polyrhiza	개구리밥	Spirodela polyrhiza	o	Melampyrum roseum Maxim.	꽃머노리밥풀		
식물상	개기장	Panicum bisulcatum	개기장	Panicum bisulcatum	o	Synurus deltooides (Aiton) Nakai	수리취		
식물상	개나리	Forsythia koreana	개나리	Forsythia koreana	o	Tilia amurensis Rupr.	피나무		
식물상	개알초	Erigeron annuus	개알초	Erigeron annuus	o	Swertia pseudochinensis H. Hara	자주손풀		
식물상	개막문홍	Liriope spicata	개막문홍	Liriope spicata	o	Galium koreanum (Nakai) Nakai	참갈퀴덩굴		
식물상	개머루	Ampelopsis brevipedunculata	개머루	Ampelopsis brevipedunculata	o	Sedum kamtschaticum Fisch. & C. A. Mey.	기린초		
식물상	개미취	Aster tataricus	개미취	Aster tataricus	o	Morus bombycis f. dissecta Nakai	좁은잎물나무		

[그림 23] 4기 보고서와 현지조사표 비교 예시

- 4개 공원, 4기 데이터 총 8,776 건에 대한 비교 작업 완료

나. 4기 데이터 시스템 반영

데이터베이스에 들어가 있는 4기 데이터들은 국립공원, 조사 분야에 해당하는 데이터들이 출력되며 통계 만들기 및 검수하기를 하면 카운트를 출력

(1) 시스템 검수 및 조회 기능

- 시스템 검수에 대한 기능은 전체, 국명 비매칭, 학명 비매칭, 공원경계 비매칭 카운트가 되며, 해당 검수를 클릭하면 해당하는 데이터들을 출력

KEY	구분	국명	과계명	과명(학명)	국명	학명	개체수	경도	위도	
2019_국립산.공유_200001	1.0	국립산	관악산	2019	관악산	만물박영과	Adiantum (Adiantum) sp.	12.0	127.8647900311	36.4801191848
2019_국립산.공유_200002	2.0	국립산	관악산	2019	관악산	갯쟁이박영과	Copelobotrys japonensis sp.	1.0	127.8647900311	36.4801191848
2019_국립산.공유_200003	3.0	국립산	관악산	2019	관악산	덩굴해당화과	Prinosia vegii	12.0	127.8647900311	36.4801191848
2019_국립산.공유_200004	4.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Cymodoche (Cymodoche) sp.	1.0	127.8647900311	36.4801191848
2019_국립산.공유_200005	5.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Leptochloa (Leptochloa) rigida	1.0	127.8647900311	36.4801191848
2019_국립산.공유_200006	6.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Hebe (Oenotheraceae)	5.0	127.8647900311	36.4801191848
2019_국립산.공유_200007	7.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Hesperis (Pseudotsuga)	2.0	127.8647900311	36.4801191848
2019_국립산.공유_200008	8.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Synchus (Crepidaceae)	9.0	127.8647900311	36.4801191848
2019_국립산.공유_200009	9.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Synchus (Synchus) c.	1.0	127.8647900311	36.4801191848
2019_국립산.공유_200010	10.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Synchus (Crepidaceae)	1.0	127.8313646795	36.484624134
2019_국립산.공유_200011	11.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Synchus (Cymodoche) c.	1.0	127.8313646795	36.484624134
2019_국립산.공유_200012	12.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Cymodoche (Cymodoche) sp.	14.0	127.8619591716	36.5160387779
2019_국립산.공유_200013	13.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Trigonostema	1.0	127.8619591716	36.5160387779
2019_국립산.공유_200014	14.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Prinosia vegii	24.0	127.8619591716	36.5160387779
2019_국립산.공유_200015	15.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Hebe (Oenotheraceae)	2.0	127.8619591716	36.5160387779
2019_국립산.공유_200016	16.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Synchus (Crepidaceae)	5.0	127.8619591716	36.5160387779
2019_국립산.공유_200017	17.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Synchus (Synchus) c.	2.0	127.8619591716	36.5160387779
2019_국립산.공유_200018	18.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Synchus sp., Synchus sp.	2.0	127.8619591716	36.5160387779
2019_국립산.공유_200019	19.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Hesperis sp., Hesperis sp.	1.0	127.8619591716	36.5160387779
2019_국립산.공유_200020	20.0	국립산	관악산	2019	관악산	해물박영과	Copelobotrys japonensis sp.	6.0	127.798444367	36.531959084

[그림 24] 4기 시스템을 통한 검증(한려해상-식물상)

- 통계에 대한 기능은 분류군, 문, 강, 목, 과, 종이 카운트가 되며, 해당 통계를 클릭하면 해당하는 리스트가 알림 창으로 출력

구분	문	강	목	과	종
문	1344				
국명 비매칭	23				
학명 비매칭	23				
공원경계 비매칭	0				
분류군	1				
문	3				
강	6				
목	82				
과	82				
종	244				

[그림 25] 4기 통계기능 (한려해상-식물상)

[그림 26] 4기 공원별 통계

- 통계에 대한 기능은 공원별 기준으로 카운트가 되며, 리스트와 통계표로 출력

[그림 27] 4기 분류군 통계

- 통계에 대한 기능은 분류군 기준으로 카운트가 되며, 리스트와 통계표로 출력

[그림 28] 4기 생물종 통계

III

결론

III. 결 론

- 정보분석시스템에서는 자연자원조사에 2기, 3기에 대한 현지조사표가 공원자원조사 결과의 토대로 국가생물종으로 전환시켜 활용하였습니다. 이에 더 나아가 국립공원연구원에서 1기 보고서의 정형화 작업으로 데이터를 추가하고, 자원통합관리시스템 고도화 사업에 적용된 현지조사표를 기반으로 한 4기 현지조사표도 시스템에 업데이트하여 활용할 수 있도록 확장하였다.
- 또한, 2기, 3기, 4기 보고서의 정형화 과정에서 현지조사표와 비교하여 현지조사표에만 있는 것과 보고서에 있는 목록을 분리하여 차이를 확인할 수 있는 기반을 만들 수 있었다.
- 1기 보고서의 정형화 작업결과 총 32138건의 데이터가 공원별로 추가되었고, 시스템에서 해당 내용을 조회/검색 가능해졌다. 1기 종 목록은 6896종으로 2기 3기 4기 데이터 통계에 반영할 수 있게 되었다.
- 2019년 조사된 자연자원조사 4기 데이터를 추가하여 정보분석시스템의 경우는 그 동안 국립공원연구원에서 조사한 현장조사내용 모두를 활용할 수 있는 시스템으로 레거시 데이터는 항상 보존하고 상황에 맞는 파생데이터를 생성할 수 있는 기초 데이터 관리 시스템으로 역할을 다할 것으로 기대된다.

IV

부록

1. 정보분석시스템 데이터 현황
2. 국립공원 담수조류 종 목록 재검토

IV. 부 록

1 정보분석시스템 데이터 현황

[표 1] 1기 공원별 총계

국립공원명	공원별 총계	곤충	담수어류	식물상	조류	양서·파충류	포유류	해양생물상	해양동물상	부착판생물상	해산어류	해조생물상	고등균류
계룡산	137	20	24	.	52	16	25	.	.	.	.	.	.
내장산	137	6	12	8	67	21	23	.	.	.	.	.	.
덕유산	325	18	19	112	123	21	32	.	.	.	.	.	.
북한산	262	.	.	126	136	.	.	.	.	.	.	.	.
설악산	645	27	61	402	94	23	38	.	.	.	.	.	.
속리산	412	17	26	208	125	20	16	.	.	.	.	.	.
오대산	150	.	28	.	76	21	25	.	.	.	.	.	.
주왕산	2,249	818	17	882	263	146	123	.	.	.	.	.	.
지리산	4,417	2,534	30	1,604	189	22	38	.	.	.	.	.	.
치악산	2,205	1,300	23	737	94	23	28	.	.	.	.	.	.
태안해상	2,665	473	.	693	686	15	.	564	180	.	53	1	.
한려해상	783	17	69	.	112	18	14	128	323	102	.	.	.
다도해해상(남해)	2,621	129	244	1,444	251	9	10	534	.	.	.	.	.
한라산	2,745	1,641	.	1,051	18	18	17	.	.	.	.	.	.
월악산	1,345	733	20	498	54	18	22	.	.	.	.	.	.
가야산	2,693	1,230	18	1,149	206	90	.	.	.	.	.	.	.
다도해해상(서해)	2,482	300	26	1,221	210	6	5	492	.	.	222	.	.
소백산	3,539	1,547	40	1,702	213	14	23	.	.	.	.	.	.
월출산	452	16	29	356	13	21	17	.	.	.	.	.	.
변산반도	1,884	688	23	876	95	25	21	.	.	.	.	.	156
총계	32,148	11,514	709	13,069	3,077	547	477	1,718	503	102	275	1	156

[표 2] 1기 보고서 현황

분류군	지리산	계룡산	한려 해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안 해안	다도해 해상	치악산	월악산	북한산	소백산	월출산	변산 반도	경주	무등산
고등균류	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
곤충	1,224	20	6	94	292	18	0	0	26	1,508	17	0	733	16	814	2,527	1,298	467	1,641	17
곤충상	0	0	0	0	0	0	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
담수어류	18	24	12	174	26	19	23	0	61	40	26	28	20	29	17	30	23	0	0	63
부착판생물 상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
식물상	1,143	0	8	1,303	1,093	110	876	123	401	1,169	203	0	495	319	880	1602	735	669	1,019	0
양서.파충류	75	16	21	9	6	21	25	0	23	14	20	21	18	20	45	22	23	15	18	18
조류	78	52	67	132	146	123	95	49	94	89	70	76	52	13	72	189	94	132	18	84
포유류	0	24	23	10	5	32	21	0	38	23	16	25	22	17	22	38	28	0	17	14
해산어류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0
해양동물상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	318
해양생물상	0	0	0	350	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	121
해양어류	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해조생물상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

[표 3] 1기 국가생물종 전환 후

분류군	지리산	계룡산	한려 해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안 해안	다도해 해상	치악산	월악산	북한산	소백산	월출산	변산 반도	경주	무등산
고등균류	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
곤충	1,104	15	6	77	243	16	0	0	19	1,150	14	0	691	10	746	49	1,208	415	934	5
곤충상	0	0	0	0	0	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
담수어류	18	24	12	167	26	19	23	0	56	39	26	28	19	29	16	29	23	0	0	53
부착판 생물상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
식물상	1,029	0	6	1,167	974	76	827	87	304	976	173	0	456	280	739	1,124	686	632	717	0
양서.파충류	34	16	20	8	6	21	23	0	21	13	19	20	18	19	32	21	23	15	18	17
조류	70	48	63	100	103	113	92	49	90	79	69	74	51	12	55	95	91	103	18	76
포유류	0	22	20	9	5	30	19	0	33	21	16	21	20	15	19	34	27	0	9	14
해산어류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
해양동물상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	298
해양생물상	0	0	0	178	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	54
해양어류	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해조생물상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

[표 4] 2기 현지조사표 현황

구분	지리산	계룡산	한려해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안해안	다도해해상	치악산	월악산	북한산	소백산	월출산	변산반도	경주	무등산	한라산	태백산
조사거미	0	0	234	0	0	167	199	0	103	139	100	251	101	122	0	148	0	0	0	0	0	0
조사경성저서무척추	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	58	90	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0
조사고등균류	0	214	0	0	252	281	22	426	244	210	179	128	493	70	0	157	155	226	226	0	0	0
조사곤충	362	626	473	0	273	362	445	1,250	980	432	21	1,283	641	740	0	923	385	564	446	0	0	0
조사담수어류	0	17	20	45	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사담수조류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	216	0	145	0	139	89	173	223	0	0	0
조사동물플랑크톤	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
조사식물상	750	470	669	0	643	576	368	767	646	562	446	1,453	686	622	0	734	0	0	752	0	0	0
조사식물플랑크톤	0	0	121	0	0	0	151	0	0	0	54	135	93	0	0	0	0	56	0	0	0	0
조사식생	0	0	0	0	0	0	0	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사아고산대식물상	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사양서류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사양서파충류	21	16	0	0	15	23	0	18	17	19	0	0	0	15	0	15	0	17	21	0	0	0
조사어류	44	0	0	0	28	29	0	22	19	16	0	104	22	27	0	33	18	30	32	0	0	0

[표 4] 계속

구분	지리산	계룡산	한려해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안해안	다도해해상	치악산	월악산	북한산	소백산	월출산	변산반도	경주	무등산	한라산	태백산
조사연성저서무척추	0	0	273	0	0	0	0	0	0	0	161	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사연체동물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사저서성대형무척추동물	119	0	113	75	76	65	77	72	0	99	0	119	84	110	0	93	94	65	99	0	0	0
조사절지동물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사조류	68	38	70	0	81	68	61	80	48	83	0	246	116	68	0	77	74	0	112	0	0	0
조사진정거미	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	119	115	0	0	0
조사특정저서무척추	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사파충류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사포유류	15	17	0	0	15	0	22	22	18	25	0	34	0	13	0	13	21	12	22	0	0	0
조사해양어류	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사해조류	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	169	95	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
조사해조류	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[표 5] 2기 국가생물종 전환 후

구분	지리산	계룡산	한려해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안해안	다도해해상	치악산	월악산	북한산	소백산	월출산	변산반도	경주	무등산	한라산	태백산
조사 거미	0	0	167	0	0	164	168	0	105	106	80	140	93	111	0	122	0	0	0	0	0	0
조사 경성저서무척추	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	34	70	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
조사 고등균류	109	193	119	0	230	253	19	385	188	169	114	106	247	68	0	109	128	191	153	0	0	0
조사 곤충	355	617	565	0	271	354	395	1,219	968	345	394	693	609	719	0	882	445	529	382	0	0	0
조사 담수어류	0	17	19	45	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 담수조류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	129	0	103	0	81	63	123	154	0	0	0
조사 동물플랑크톤	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	12	37	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
조사 식물장	486	462	412	0	623	564	359	739	630	512	402	1,228	666	608	0	702	391	217	650	0	0	0
조사 식물플랑크톤	0	0	58	0	0	0	98	0	0	0	18	85	75	0	0	0	0	22	0	0	0	0
조사 식생	203	157	0	0	292	144	123	263	250	0	0	0	203	0	0	284	0	0	0	0	0	0
조사 아고산대식물상	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 양서류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 양서류파충류	20	16	17	0	15	22	16	17	17	19	17	19	16	15	0	15	14	17	21	0	0	0

[표 5] 계속

구분	지리산	계룡산	한려해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안해안	다도해해상	치악산	월악산	북한산	소백산	월출산	변산반도	경주	무등산	한라산	태백산
조사 어류	31	0	0	0	27	24	0	21	19	16	0	100	21	27	0	32	18	29	32	0	0	0
조사 연성저서 무척추	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	88	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 연체동물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 저서성 대형무척 추동물	76	0	55	60	62	50	52	55	0	62	0	84	62	77	0	67	56	44	61	0	0	0
조사 절지동물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 조류	67	38	70	0	80	66	59	78	48	72	102	190	115	67	0	76	73	95	109	0	0	0
조사 진정거미	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	96	82	0	0	0
조사 특성저서 무척추	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 파충류	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 포유류	21	14	13	0	15	14	19	19	18	22	11	19	17	13	0	14	20	11	19	0	0	0
조사 해알어류	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 해조류	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	101	68	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
조사 해초류	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[표 6] 3기 현지조사표 현황

구분	지리산	계룡산	한려해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안해안	다도해해상	치악산	월악산	북한산	소백산	월출산	변산반도	경주	무등산	한라산	태백산
조사거미	141	0	180	0	135	192	185	0	217	705	146	231	169	174	0	163	177	202	183	164	0	153
조사경성저서무척추	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사고등균류	218	180	251	153	0	239	481	0	0	503	199	515	355	286	198	326	433	299	429	248	0	344
조사곤충	1,151	963	1,336	1,247	0	802	1,386	521	1,448	1,319	1,003	1,944	1,181	1,300	542	1,687	976	1,288	947	770	0	733
조사담수어류	0	0	21	0	0	32	0	0	0	18	0	28	0	0	0	0	20	39	34	0	0	19
조사담수조류	42	0	123	61	60	135	153	0	197	208	0	250	103	195	0	111	222	226	309	60	0	138
조사동물플랑크톤	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사식물상	433	0	983	232	643	733	974	0	0	2,686	739	1,351	741	1,092	0	878	526	927	699	366	0	1,100
조사식물플랑크톤	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사식생	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사아고잔대식물상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사양서류	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	5	8	11	11	0	9	10	9	10	0	0	7
조사양서류파충류	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사어류	0	19	0	42	0	0	16	20	30	0	0	9	24	28	0	30	0	0	0	0	0	0

[표 6] 계속

구분	지리산	계룡산	한려해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안해안	다도해해상	치악산	월악산	북한산	소백산	월출산	범산반도	경주	무등산	한라산	태백산
조사연성저서무척추	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사연체동물	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사저서성무척추동물	137	139	132	167	128	161	101	101	252	199	0	250	149	168	0	115	0	148	148	160	0	187
조사절지동물	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사조류	88	80	80	121	97	118	78	64	96	77	125	200	93	87	106	91	0	102	95	86	0	81
조사진정거미	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0
조사특정저서무척추	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사파충류	0	0	0	0	0	0	5	0	0	13	10	16	7	11	0	10	9	9	11	0	0	7
조사포유류	0	0	16	18	0	30	32	22	30	33	13	39	29	38	22	39	20	25	36	20	0	31
조사해양어류	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사해조류	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사해조류	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[표 7] 3기 국가생물종 전환 후

구분	지리산	계룡산	한려해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안해안	다도해해상	치악산	월악산	북한산	소백산	월출산	변산반도	경주	무등산	한라산	대백산
조사 거미	104	0	172	0	102	173	183	0	164	601	137	215	166	169	0	162	170	197	181	150	0	153
조사 경성저서무척추	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 고등균류	182	167	230	289	121	175	410	275	1	401	184	296	294	246	126	265	334	237	362	147	0	302
조사 곤충	1,121	872	1,206	1,026	0	711	1,233	477	1,129	1,228	980	1,536	1,141	1,213	512	1,500	939	1,236	925	676	0	710
조사 담수어류	0	0	19	0	0	30	0	0	0	18	0	28	0	0	0	0	20	37	34	0	0	19
조사 담수조류	33	0	84	48	41	51	114	0	103	159	0	155	82	141	0	85	159	167	220	29	0	88
조사 동물플랑크톤	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 식물상	413	0	931	146	603	699	932	0	599	715	717	1,445	725	1,036	0	845	511	892	680	322	0	1,028
조사 식물플랑크톤	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 식생	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 아고산대식물상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 양서류	0	0	8	0	0	21	10	0	0	10	5	8	11	11	0	9	10	9	10	0	0	7
조사 양서류총류	13	18	0	16	20	0	0	13	18	0	0	17	0	0	7	0	0	0	0	14	0	0

[표 7] 계속

구분	지리산	계룡산	한려해상	설악산	속리산	내장산	가야산	덕유산	오대산	주왕산	태안해안	다도해해상	치악산	월악산	북한산	소백산	월출산	범사반도	경주	무등산	한라산	태백산
조사 어류	31	19	0	36	31	0	16	20	25	0	0	9	24	28	0	30	0	0	0	16	0	0
조사 연성저 서무척 추	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 연체동 물	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 저서성 대형무 척추동 물	99	92	105	85	73	117	87	70	125	156	0	165	114	130	0	88	0	126	116	117	0	130
조사 절지동 물	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 조류	81	61	79	118	95	108	78	64	89	72	123	182	93	86	96	89	0	96	92	86	0	79
조사 진정거 미	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
조사 특정저 서무척 추	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 파충류	0	0	10	0	0	0	5	0	0	12	10	15	7	11	0	10	9	9	9	0	0	7
조사 포유류	18	16	21	22	16	26	28	19	21	31	11	27	27	32	19	33	18	19	30	17	0	25
조사 해양어 류	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 해조류	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사 해조류	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[표 8] 4기 현지조사표 현황

분류군	북한산	속리산	지리산	한려해상
고등균류	711	424	552	362
곤충	951	1,214	847	703
담수조류	197	191	254	113
식물상	527	466	767	248
양서류	11	9	10	7
어류	5	9	14	4
저서성대형무척추동물	69	129	196	99
조류	48	36	37	28
파충류	3	7	8	5
포유류	16	13	24	21

[표 9] 4기 국가생물종 전환 후

분류군	북한산	속리산	지리산	한려해상
고등균류	347	384	443	303
곤충	928	1,182	822	693
담수조류	121	81	152	68
식물상	523	458	748	245
양서류	11	9	10	7
어류	4	8	13	3
저서성대형무척추동물	57	109	132	78
조류	48	36	37	28
파충류	3	7	8	5
포유류	11	13	22	18

2 국립공원 담수조류 종 목록 재검토

가. 개요

- 담수조류는 지구상의 모든 곳에 분포하는 생물체이다. 지구의 가장 더운 지역인 적도에서부터 가장 추운 지역인 극지방 까지 지구 전역에 분포하고 있다. 담수조류의 서식처는 대부분 물이 존재하는 수역 즉 호수, 강, 습지 등에 주로 서식하며, 대부분의 생물체들에게는 극단적인 지역 즉 눈, 일시적인 웅덩이, 습윤한 암벽과 토양, 나뭇잎 등에서도 분포하고 있다.
- 수계에서 담수조류의 생태학적 역할은 육상생태계의 식물과 같은 역할을 한다. 담수조류는 동물플랑크톤, 저서성 어류, 치어 등의 먹이로서 역할을 한다, 또한 산소를 생성하여 수계의 용존산소를 풍부하게 하고 일부는 대기 중으로 방출되어 공기 중 산소를 풍부하게 한다(김광용 등, 2003). 일부는 생물학적 질소를 만들어 질소가 부족한 지역에 질소를 공급하여 생물체가 이용할 수 있게 한다, 미량원소의 생지구화학적 순환과정에서 자연계에 존재하는 질소, 인, 나트륨 등 다양한 원소를 흡수하여 먹이사슬을 통해 상위계급자까지 전달하여 지구상의 생물들이 정상적인 활동을 할 수 있도록 한다.
- 인류의 활용으로는 유전자의 전달체의 연구, 신호전달체계 과정, 유기물 합성과정 등을 밝히는 연구 재료로 생물학의 다양한 분야에서 이용하고 있다(김, 2010). 일부 담수조류는 다양한 아미노산, 특이한 색소체(아스타크산틴 등)의 이용, 강력한 항산화제로 활용을 위해 대량배양을 통해 건강식품으로 이용하고 있다(윤양호 등, 2012).
- 일부 담수조류 중 녹조류 및 부착규조류는 수계내 질소나 인 및 유기물질의 농도 차이에 의한 영양화(호수: 부영양화, 중영양화, 빈영양화), 생태적 분류(하천: 청수성 분류군, 오염성 분류군, 광적응성 분류군)를 근거를 하여 수환경 건강성 평가에 활용하고 있다(최영길 등, 2000).
- 이와 같이 생물학적, 생태적, 공학적 활용 등 다양한 방면에서 많이 활용하고 있는 담수조류의 분류학적 연구는 1800년대 중반 전·후부터 본격적인 연구가 진행되어 현재까지 이르고 있다. 담수조류의 학명은 세포 외부의 형태, 돌기, 가지 모양, 점액질의 유·무, 엽록체의 모양 및 수, 피레노이드 유·무 등을 근거한 스케치를 통해 학명을 인정받았다. 그러나 DNA 조작 기술이 발전하고 담수조류의 각 종에 대한 대량배양기술이 발달하면서 눈에 보이지 않고 현미경만으로도 보이는 이 생물체에 계통적인 분석이 적용되면서 과거에 지정된 학명에 거의 혁명적인 사건이 발생하였다(이인규 등, 2004)). 즉 형태적인 바탕을 근거로 한 학명에 많은 변화가 일어나면서 연속적으로 상위계급에도 큰 변화가 일어났다. 또한 증명에서도 새롭게 생긴 학명이 있는 반면 완전히 사라진 경우도 있었고, 혹은 기본명에서 새롭게 조합되거나 새로운 증명이 한 개 혹은 3개 이상의 학명으로 분리되는 대변동이 일어났다. 물론 기존 학명의 변화는 기술 발전 및 계통학의 발달뿐만 아니라 과거 정보화 민주주의 이전(인터넷)에 발표된 논문의 발굴, 국제분류학회 결성 및 기준 마련 등도 기존의 학명에 대한 많은 변화를 주었다(장과 흥, 2012).
- 국립공원 담수조류 종 목록 검토의 목적은 기존 학명에 많은 변화(변동)가 발생한 학명에 대해 최근

의 학명을 적용함으로써 국제적 흐름에 동참하고자 하였으며, 현재 국립생물자원관에서는 담수조류에 대해 학명 재정립을 시도하고자 하고 있는데 국가생물종목록은 아직도 과거의 학명을 사용하고 있기에 선제적 대응을 하고자 하였다. 물론 본 종 목록 재검토는 완벽한 것은 아니다. 현재도 학명이 지속적으로 재조합 및 분리, 변경되고 있고 또한 학명 유지에서 기존의 학명이 변경될 경우 많은 혼란을 야기할 경우 비록 명명규약에는 맞지 않으나 기존의 학명을 유지하도록 권고하고 있다. 특히 국내의 경우 담수조류의 전문가는 극히 적고 후배들조차 거의 양성되지 않는 상태에서 급격하게 변경될 경우 특히 생태연구에 많은 혼란을 야기할 수 있기에 일부 분류군의 종명은 기존의 학명을 그대로 유지하였고, 이에 대한 변경은 국가생물종목이 발표되면 그 시기에 변경하고자 한다. 종목록 재검토에는 해양식물플랑크톤은 본 검토에서 제외하였다.

Ⅰ 종 목록 재검토에 참고한 문헌

- 2기, 3기 국립공원자연자원조사(2006~2018)
 - 지리산 모니터링 보고서. 지리산관리사무소(2000)
 - 지리산국립공원 자원모니터링 보고서. 제2부 특정분야 자원모니터링(2004)
 - 설악산국립공원 백담계곡 계류생태계 조사 및 보존 대책(1998)
 - 설악산국립공원 백담계곡 모니터링 3차년도보고서(2000)
 - 국립공원 내륙습지 정밀조사(2007)
 - 국립공원내 담수조류의 현황(2010)
- 본 종 목록 재검토에서 정리한 학명은 현재 전 세계의 학명을 정리한 웹사이트인 algaebase (www.algaebase.org)의 자료에 따라 정리하였다. 본 사이트는 최초 지정된 종명과 관련 자료, 가장 최근의 종명관련 자료 등을 확보하고 있으며 한국조류학회, 국제조류학회, 미국조류학회, 영국조류학회, 독일 SAG Culture Collection of Algae 등 전 세계의 조류학회 및 배양센터에 지원 및 후원 받고 있다. 159,739 종명과 종하분류군의 학명, 22,561 건의 조류 관련 사진, 465,204건의 조류 분포지, 62,408건의 조류 관련 서적을 확보하고 있다.

나. 결과 및 고찰

- 기존 조사된 결과물을 정리한 결과 모두 1,005종류로 정리되었으며 분류계급은 8문 3아문 4아강 18강 13아강 38문 1아문 110과 127속 874종 120변종 11품종으로 정리되었다.
- 군집별 출현 종수에서 규조류가 464종으로 가장 많이 출현하였으며, 녹조류가 235종류, 윤조류가 111종류, 유글레나류가 92종류, 남조류가 72종류가 출현하였다. 국립공원은 대부분 하천이 발달하고 호수나 습지 등 정수역의 분포는 매우 적다. 규조류는 대부분 돌에 부착해서 서식하는 부착성 규조류가 관찰되었고, 녹조류는 습지나 저수지 등에 서식하는 종류들이 조사되었다. 그리고 국내 대부분의 저수지에서 하계에 관찰되는 녹조 현상은 극히 일부의 저수지에서 관찰되었으며 지리산의 왕등

재 등 고산습지에서는 윤조류가 많이 관찰되었다.

[표 1] 국립공원에서 확보된 담수조류의 분류체계

문	아문	상강	강	아강	문	아문	과	속	종	변종	품종	합계
녹조류	1		4		13		38		207	24	4	235
윤조류			2	1	3		6	20	89	20	2	111
남조류			1	4	5		16	31	70	2		72
유글레나조류		2	3	3	3	1	4	10	81	11		92
대롱편모조류		1	3		4		8	8	15	1		16
와편모조류		1	1		3		3	4	7			7
은편모조류			1		2		4	5	8			8
규조류	2		3	5	5		31	49	397	62	5	464
계	3	4	18	13	38	1	110	127	874	120	11	1,005

Ⅰ 녹조류

- 상위계급이 변경된 종류는 *Micrathamnion kuetzingianum* Kägeli, *Coccomyxa corbierei* Wille, *Stichococcus pelagicus* (Nygaard) Hindak, *Golenkinia solitaria* Korshikov, *Tetrastrum komarekii* Hindák, *Chlorella ellipsoidea* Gerneck는 Trebouxiophyceae 강으로, *Platymonas subcordiformis* (Wille) Hazen는 Chlorodendrophyceae 강으로, *Characium obtusum* A. Braunsms는 Ulvophyceae 강으로, *Tetraëdron hastatum* (Reinsch) Hansgirg, *Tetraëdron planctonicum* Smith, *Tetraëdron regulare* Kützing, *Schizochlamydeella delicatula* (West) Korshikov는 Ochrophyta로 이전되었다.
- 속의 분리는 녹조류 중 출현한 종류들 중에서 가장 흔히 출현하며 국내 대부분의 저수지, 습지 등에서 관찰되는 *Pediastrum*은 학명이 *Lacunastrum*, *Pediastrum*, *Parapediastrium*, *Pseudopediastrium* 등으로 4개의 속으로 분리되었다. *Scenedesmus* 속은 *Desmodesmus*와 *Scenedesmus* 속으로 분리되었다. 분리된 *Scenedesmus* 속의 종류에서 세포벽이 매끈하거나(예 *Scenedesmus ecornis*) 가시가 있는 종류(*Scenedesmus quadricauda*)로 극명하게 나눌 수 있다. *Scenedesmus* 속은 이러한 특징으로 새로운 속(*Acutodesmus*)이 제안되고 있는 실정이다. *Sphaerellopsis* 속은 *Vitreochlamys* 속으로 *Gonium sociale* (Dujardin) Warming은 *Tetrabaena socialis* (Dujardin) H.Nozaki & M.Itoh, *Characium obtusum* A. Braun은 *Pseudocharacium obtusum* (A.Braun) Petry-Hesse, *Tetraëdron hastatum* (Reinsch) Hansgirg은 *Pseudostaurastrum enorme* (Ralfs) Chodat, *Tetraëdron planctonicum* Smith은 *Pseudostaurastrum planctonicum* (G.M.Smith) Krienitz & Heynig, *Golenkinia solitaria* Korshikov는 *Golenkiniopsis solitaria* (Korshikov) Korshikov로 학명이 변경되었다. 기타 변경된 학명은 [표 2]를 참조하길 바란다.

[표 2] 학명이 검토된 녹조류의 분류체계

Phylum Chlorophyta
Class Chlorodendrophyceae
Order Chlorodendrales
Family Chlorodendraceae
<i>Tetraselmis subcordiformis</i> (Wille) Butcher
Subphylum Chlorophytina
Class Chlorophyceae
Order Chaetophorales
Family Chaetophoraceae
<i>Chaetophoropsis elegans</i> (Roth) B.Wen Liu, Qian Xiong, X.Dong Liu, Z.Yu Hu & G.Xiang Liu
<i>Chaetophoropsis pisiformis</i> (Roth) B.Wen Liu, Qian Xiong, X.Dong Liu, Z.Yu Hu & G.Xiang Liu
<i>Draparnaldia acuta</i> (C.Agardh) Kützing
<i>Draparnaldia mutabilis</i> (Roth) Bory
<i>Stigeoclonium tenue</i> (Agardh) Kützing
Order Chlamydomonadales
Family Chlamydomonadaceae
<i>Carteria peterhofiensis</i> Kissekev
<i>Chlamydomonas angulosa</i> Dil
<i>Chloromonas tapeta</i> (Skuja) Gerloff & H.Ettl in H.Ettl
<i>Chlamydomonas globosa</i> J.W.Snow
<i>Vitreochlamys gloeocystiformis</i> (O.Dill) A.Nakazawa in Nakazawa, Krienitz & Nozaki
<i>Vitreochlamys lefevrei</i> (Bourrelly) Menezes & C.E.M.Bicudo
Family Chlorococcaceae
<i>Chlorococcum infusionum</i> (Schrank) Meneghini
<i>Chlorococcum echinozygotum</i> R.C.Starr
Family Goniaceae (Pascher) Pascher
<i>Gonium pectorale</i> Müller
Family Haematococcaceae Smith
<i>Haematococcus lacustris</i> (Girod-Chantrons) Rostafinski
Family Palmellopsidaceae Korshikov
<i>Asterococcus superbus</i> (Cienkowsk) Scherffel
<i>Chlamydocapsa planctonica</i> (West & G.S.West) Fott

[표 2] 계속

<i>Palmella mucosa</i> Kützing
<i>Sphaerello cystis ampla</i> (Kützing) Nováková
Family Phacotaceae Frabcé
<i>Phacotus lenticularis</i> (Ehrenberg) Diesing
<i>Pteromonas aculeata</i> var. <i>lemmermannii</i> Skuja
Family Sphaerocystoidaceae Fott ex Tsarenko
<i>Sphaerocystis planctonica</i> (Korshikov) Bourrelly
<i>Sphaerocystis schroeteri</i> Chadat 1897
Family Tetrabaenaceae
<i>Tetrabaena socialis</i> (Dujardin) H.Nozaki & M.Itoh
Family Volvocaceae Ehrenberg
<i>Eudorina cylindrica</i> Korshikov
<i>Eudorina elegans</i> Ehrenberg
<i>Eudorina unicocca</i> G.M. Smith
<i>Pandorina morum</i> Bory
<i>Pleodorina californica</i> Shaw
<i>Volvox aureus</i> Ehrenberg
Order Chlorophyceae incertae sedis
Family Chlorophyceae familia incertae sedis
<i>Diplochloris dichotomococcoides</i> Fott
Order Sphaeropleales
Family haraciaceae (Nägeli) Wittrock
<i>Characium ambiguum</i> Herman in Rabenhorst
<i>Characium braunii</i> Brügger
<i>Characium ornithocephalum</i> A. Braun
<i>Characium ornithocephalum</i> var. <i>harpochytriforme</i> Printz
Family Hydrodictyaceae
<i>Lacunastrum gracillimum</i> (West & G.S.West) H.McManus
<i>Monactinus simplex</i> (Meyen) Corda
<i>Monactinus simplex</i> var. <i>echinulatum</i> (Wittrock) Pérez, Maidana & Comas
<i>Parapediastrum biradiatum</i> (Meyen) E.Hegewald
<i>Parapediastrum biradiatum</i> var. <i>emarginatum</i> f. <i>convexum</i> Prescott

[표 2] 계속

<i>Parapediastrum biradiatum</i> var. <i>longecornutum</i> (Gutwinski) Tsarenko
<i>Pediastrum angulosum</i> Ehrenberg ex Meneghini
<i>Pediastrum</i> cf. <i>duplex</i> Meyen
<i>Pediastrum duplex</i> Meyen
<i>Pediastrum duplex</i> var. <i>asperum</i> (Braun) Hansgirg
<i>Pediastrum duplex</i> var. <i>rotundatum</i> Lucks
<i>Pediastrum napoleonis</i> Ralfs
<i>Pseudopediastrum boryanum</i> (Turpin) E.Hegewald
<i>Pseudopediastrum boryanum</i> var. <i>brevicorne</i> A. Braun
<i>Pseudopediastrum boryanum</i> var. <i>longicorne</i> Reinsch
<i>Sorastrum spinulosum</i> Nägeli
<i>Stauridium tetras</i> (Ehrenberg) E.Hegewald
<i>Stauridium tetras</i> var. <i>tetraodon</i> (Corda) J.D.Hall & Karol
<i>Tetraëdron caudatum</i> (Corda) Hansgirg
<i>Tetraëdron minumum</i> (Braun) Hansgirg
<i>Tetraëdron proteiforme</i> var. <i>granulatum</i> Hortobagyi
<i>Tetraëdron trigonum</i> (Nägeli) Hansgirg
Family Microsporaceae
<i>Microspora irregularis</i> (West & West) Wichmann
<i>Microspora quadrata</i> Hazen
<i>Microspora tumidula</i> Hazen
<i>Microspora willeana</i> Lagerheim
Family Mychonastaceae
<i>Mychonastes elegans</i> (Bachmann) Krienitz, C.Bock, Dadheech & Proschold
Family Neochloridaceae Ettl & Komárek
<i>Botryosphaerella sudetica</i> (Lemmermann) P.C. Silva
<i>Golenkinia paucispina</i> West & West
<i>Golenkinia radiata</i> (Chodat) Wille
Family Radiococcaceae
<i>Coenochloris pyrenoidosa</i> Korschikov
<i>Coenochloris fottii</i> (Hindák) Tsarenko
<i>Coenochloris sphagnicola</i> Hindák
<i>Coenocystis planktonica</i> Korschikov
<i>Gloeocystis papuana</i> (Shin Watanabe) H.Ettl & G.Gärtner
<i>Gloeocystis vesiculosa</i> Nägeli

[표 2] 계속

<i>Radiococcus</i> cf. <i>bavaricus</i>
<i>Radiococcus polycoccus</i> (Korshikov) Kostikov, Darienko, Lukesová & L.Hoffmann
Family Scenedesmaceae
<i>Coelastrum astroideum</i> De Notaris
<i>Coelastrum cambricum</i> Archer
<i>Coelastrum microporum</i> Nägeli in Braun
<i>Coelastrum proboscideum</i> Bohlin in Wittrock, Nordstedt & Lagerheim
<i>Coelastrum reticulatum</i> var. <i>cubanum</i> Komárek
<i>Coelastrum sphaericum</i> Nägeli
<i>Comasiella arcuata</i> var. <i>platydisca</i> (G.M.Smith) E.Hegewald & M.Wolf in Hegewald & al.
<i>Desmodesmus abundans</i> (Kirchner) E.H.Hegewald
<i>Desmodesmus armatus</i> (Chodat) E.H.Hegewald
<i>Desmodesmus armatus</i> var. <i>longispina</i> (Chodat) E.Hegewald
<i>Desmodesmus armatus</i> var. <i>subalternans</i> (G.M.Smith) E.Hegewald
<i>Desmodesmus arthrodesmiformis</i> (Schröder) S.S.An, Friedl & E.Hegewald
<i>Desmodesmus brasiliensis</i> (Bohlin) E.Hegewald
<i>Desmodesmus communis</i> (E.Hegewald) E.Hegewald
<i>Desmodesmus costatogranulatus</i> (Skuja) E.Hegewald
<i>Desmodesmus denticulatus</i> (Lagerheim) S.S.An, T.Friedl & E.Hegewald
<i>Desmodesmus denticulatus</i> var. <i>fenestratus</i> (Teiling) E.Hegewald
<i>Desmodesmus denticulatus</i> var. <i>linearis</i> (Hansgirg) Hegewald
<i>Desmodesmus dispar</i> (Brébisson) E.Hegewald
<i>Desmodesmus granulatus</i> (West & G.S.West) Tsarenko
<i>Desmodesmus intermedius</i> (Chodat) E.Hegewald
<i>Desmodesmus intermedius</i> var. <i>balatonicus</i> (Hortobágyi) P.Tsarenko
<i>Desmodesmus lunatus</i> (West & G.S.West) E.Hegewald
<i>Desmodesmus maximus</i> (West & G.S.West) Hegewald
<i>Desmodesmus opoliensis</i> (P.G.Richter) E.Hegewald
<i>Desmodesmus protuberans</i> (F.E.Fritsch & M.F.Rich) E.Hegewald
<i>Desmodesmus pseudodenticulatus</i> (E.Hegewald) E.Hegewald
<i>Desmodesmus serratus</i> (Corda) S.S.An, Friedl & E.Hegewald
<i>Desmodesmus spinosus</i> (Chodat) E.Hegewald
<i>Desmodesmus spinosus</i> var. <i>bicaudatus</i> (Hortobágyi) Täuscher
<i>Desmodesmus subspicatus</i> (Chodat) E.Hegewald & A.W.F.Schmidt
<i>Dimorphococcus lunatus</i> Lunatus
<i>Enallax costatus</i> (Schmidle) Pascher
<i>Hariotina polychorda</i> (Korshikov) E.Hegewald in E.Hegewald, P.F.M.Coesel & P.Hegewald
<i>Hariotina reticulata</i> P.A.Dangeard

[표 2] 계속

<i>Pseudodidymocystis fina</i> (Komárek) E.Hegewald & Deason
<i>Pseudodidymocystis planctonica</i> (Korshikov) E.Hegewald & Deason
<i>Scenedesmus abundans</i> (Kirchner) Chodat
<i>Scenedesmus acutus</i> f. <i>tetradesmiformis</i> (Woloszynaska) Uherkovich
<i>Scenedesmus aldavei</i> E. Hegewald
<i>Scenedesmus arcuatus</i> (Lemmermann) Lemmermann
<i>Scenedesmus armatus</i> var. <i>bicaudatus</i> (Guglielmetti) Chodat
<i>Scenedesmus bicaudatus</i> (Hansgirg) Chodat
<i>Scenedesmus bijugus</i> (Turpin) Lagerheim
<i>Scenedesmus brevispina</i> (Smith) Chodat
<i>Scenedesmus dimorphus</i> (Turpin) Kützing
<i>Scenedesmus ecornis</i> (Ehrenberg) Chodat
<i>Scenedesmus ellipticus</i> Corda
<i>Scenedesmus grahneisii</i> (Heynig) Fott
<i>Scenedesmus heteracanthus</i> P. González
<i>Scenedesmus joivis</i> Chodat
<i>Scenedesmus obtusus</i> f. <i>disciformis</i> (Chodat) Compère
<i>Scenedesmus obtusus</i> f. <i>obciturus</i> (Uherkovich) Taşkin & Alp
<i>Scenedesmus obtusus</i> Meyen
<i>Scenedesmus quadricauda</i> (Turpin) Brébisson in Brébisson & Godey
<i>Scenedesmus raciborskii</i> Woloszynska
<i>Scenedesmus semipulcher</i> Hortobágyi
<i>Scenedesmus smithii</i> Chodat
<i>Scenedesmus tetradesmiformis</i> (Wolosz.) Chodat
<i>Scenedesmus verrucosus</i> Roll
<i>Secnedesmus soli</i> Hortobágyi
<i>Tetradesmus bernardii</i> (G.M.Smith) M.J.Wynne
<i>Tetradesmus incrassatulus</i> (Bohlin) M.J.Wynne
<i>Tetradesmus lagerheimii</i> M.J.Wynne & Guiry
<i>Tetradesmus major</i> Smith
<i>Tetradesmus obliquus</i> (Turpin) M.J.Wynne
<i>Tetradesmus wisconsinensis</i> f. <i>sibirica</i> (Printz) Fott and Komarek
<i>Tetrastrum elegans</i> Playfair
<i>Tetrastrum heteracanthum</i> (Nordstedt) Chodat
<i>Tetrastrum staurogeniaeforme</i> (Schröder) Lemmermann
<i>Westella botryoides</i> (West) De Wildeman
<i>Willea apiculata</i> (Lemmermann) D.M.John, M.J.Wynne & P.M.Tsarenko
<i>Willea saguei</i> (Komárek) D.M.John, M.J.Wynne & P.M.Tsarenko

[표 2] 계속

Family Schizochlamydeaceae Fuciková, Lewis & Lewis
<i>Planktosphaeria gelatinosa</i> Smith
Family Schroederiaceae Fuciková, P.O.Lewis & L.A.Lewis
<i>Schroederia setigera</i> (Schröder) Lemmermann
Family Sphaeropleales incertae sedis
<i>Polyedriopsis spinulosa</i> (Schmidle) Schmidle
Family Selenastraceae Blackman & Tansley
<i>Ankistrodesmus bernardii</i> Komárek
<i>Ankistrodesmus arcuatus</i> Korshikov
<i>Ankistrodesmus falcatus</i> (Corda) Ralfs
<i>Ankistrodesmus spiralis</i> (Turner) Lemmermann
<i>Ankistrodesmus stipitatus</i> Komárková-Legnerová
<i>Ankistrodesmus westii</i> Smith
<i>Gregiochloris lacustris</i> (Chodat) Marvan, Komárek & Comas
<i>Kirchneriella diana</i> (Bohlin) Comas
<i>Kirchneriella diana</i> var. <i>major</i> (Korshikov) Comas
<i>Kirchneriella irregularis</i> (G.M.Smith) Korshikov
<i>Kirchneriella irregularis</i> var. <i>spiralis</i> Korshikov
<i>Kirchneriella lunaris</i> (Kirchner) Möbius
<i>Kirchneriella obesa</i> (West) West & West
<i>Messastrum gracile</i> (Reinsch) T.S.Garcia in T.S.Garcia & al.
<i>Messastrum gracile</i> var. <i>westii</i> (G.M.Smith) L.Täuscher
<i>Monoraphidium circulare</i> (Nygaard) Nygaard
<i>Monoraphidium contortum</i> (Thuret) Komárek-Legnerová in Fott
<i>Monoraphidium griffithii</i> (Berkeley) Komárek-Legnerová
<i>Monoraphidium indicum</i> Hindák
<i>Monoraphidium irregulare</i> (Smith) Komárková-Legnerová
<i>Monoraphidium komarkovae</i> Nygaard
<i>Monoraphidium minutum</i> Komárková-Legnerová
<i>Monoraphidium nanum</i> (Ettl) Hindák
<i>Monoraphidium obtusum</i> (Korshikov) Komárková-Legnerová
<i>Pseudokirchneriella elongata</i> (G.M.Smith) Hindák
<i>Quadrigula chodatii</i> (Tanner-Füllemann) Smith
<i>Quadrigula closterioides</i> (Bohlin) Printz
<i>Raphidocelis contorta</i> var. <i>gracillima</i> (Bohlin) P.Marvan, J.Komárek & A.Comas
<i>Selenastrum bibraianum</i> Reinsch

[표 2] 계속

Family Treubariaceae (Korshikov) Fott
<i>Treubaria schumidlei</i> (Schröder) Froo & Kovaikcik
<i>Treubaria triappendiculata</i> C.Bernard
Class Trebouxiophyceae Friedl
Order Chlorellales Bold & Wynne
Family Chlorellaceae Brunthaler
<i>Acanthosphaera zachariasii</i> Lemmerman
<i>Actinastrum fluviatile</i> (J.L.B.Schröder) Fott
<i>Actinastrum hantzschii</i> Lagerheim
<i>Actinastrum hantzschii</i> var. <i>subtile</i> Woloszynska
<i>Chlorella vulgaris</i> Beyerínck
<i>Closteriopsis longissima</i> (Lemmermann) Lemmermann
<i>Dictyosphaerium ehrenbergianum</i> Nägeli
<i>Geminella minor</i> (Nägeli) Heering
<i>Golenkiniopsis solitaria</i> (Korshikov) Korshikov
<i>Micractinium pusillum</i> Fresenius
<i>Mucidosphaerium pulchellum</i> (H.C.Wood) C.Bock, Proschold & Krienitz
Family Eremosphaeraceae
<i>Neglectella solitaria</i> (Wittrock) Stenclová & Kastovsky in Stenclová et al
Family Oocystaceae Bohlin
<i>Eremosphaera viridis</i> De Bary
<i>Franceia elongata</i> Korshikov
<i>Lagerheimia ciliata</i> (Lagarheim) Chodat
<i>Lagerheimia citrifomis</i> (Snow) Collins
<i>Lagerheimia genevensis</i> (Lagerheim) Chodat
<i>Lagerheimia longiseta</i> (Lemmermann) Printz
<i>Lagerheimia quadriseta</i> (Lemmermann) Smith
<i>Lagerheimia subsalsa</i> Lemmermann
<i>Makinoella tosaensis</i> Y.Okada
<i>Nephrochlamys allanthoidea</i> Korshikov
<i>Nephrochlamys danica</i> Komárek
<i>Nephrochlamys subsolitaria</i> (G.S. West) korshikov
<i>Nephrochlamys willeana</i> (Printz) Korshikov
<i>Nephrocytium agardhianum</i> Nägeli
<i>Nephrocytium allantoideum</i> (Bohlin) Chodat

[표 2] 계속

<i>Oocystis borgei</i> Snow
<i>Oocystis lacustris</i> Chodat
<i>Oocystis natans</i> var. <i>major</i> Smith
<i>Oocystis parva</i> West & West
<i>Oocystis submarina</i> Lagerheim
Order Microthamniales
Family Microthamniaceae
<i>Micrathamnion kuetzingianum</i> Kägeli
Order Prasiolales
Family Koliellaceae
<i>Raphidonema nivale</i> Lagerheim
Family Stichococcaceae
<i>Desmococcus olivaceus</i> (Persoon ex Acharius) J.R.Laundon
<i>Stichococcus pelagicus</i> (Nygaard) Hindak
Order Trebouxiales Friedl
Family Botryococcaceae Wille
<i>Botryococcus braunii</i> Kützing
<i>Selenodictyum brasiliense</i> Uherkovick & Schmidt
Order Trebouxiophyceae ordo incertae sedis
Family Coccomyxaceae
<i>Coccomyxa corbierei</i> Wille
<i>Coccomyxa dispar</i> var. <i>antarctica</i> Kol
<i>Dactylothece braunii</i> Lagerheim
Family Trebouxiophyceae incertae sedis
<i>Chloroidium ellipsoideum</i> (Gerneck) Darienko, Gustavs, Mudimu, Menendez, Schumann, Karsten, Friedl & Proschold
<i>Crucigenia fenestrata</i> (Schmidle) Schmidle
<i>Crucigenia quadrata</i> Morren
<i>Crucigenia tetrapedia</i> (Kirchner) Kuntze
<i>Lemmermannia komarekii</i> (Hindák) C.Bock & Krienitz in Bock & al.
<i>Lemmermannia triangularis</i> (Chodat) C.Bock & Krienitz in C.Bock & al.
Class Ulvophyceae Mattox & Stewart
Order Cladophorales Haeckel

[표 2] 계속

Family Cladophoraceae Wille in Warming
<i>Cladophora glomerata</i> var. <i>crassior</i> (C.Agardh) C.Hoek
<i>Rhizoclonium fontanum</i> Kützing
Order Ignatiales
Family Ignatiaceae
<i>Pseudocharacium obtusum</i> (A.Braun) Petry-Hesse
Order Ulotrichales Borzi
Family Ulotrichaceae Kützing
<i>Ulothrix cylindricum</i> Prescott
<i>Ulothrix zonata</i> (Weber & Mohr) Kützing
Order Ulvales
Family Ulvaceae
<i>Ulva flexuosa</i> Wulfen
Family Cloniophoraceae
<i>Cloniophora plumosa</i> (Kützing) Bourrelly

| 윤조류

- *Netrium interruptum* (Ralds) Lütkemuller⁰ | *Planotaenium interruptum* (Brébisson ex Ralfs) Petlovany & Palamar-Mordvintseva in Palamar-Mordvintseva & Petlovany, *Netrium interruptum* var. *minor* (borge) Kriger⁰ | *Planotaenium interruptum* var. *minus* (Borge) Petlovany & Palamar-Mordvintseva in Palamar-Mordvintseva & Petlovany^{fh} 로 학명이 변경되었다. 윤조류는 학명의 변경이 일부분이었고 대부분은 조사자의 오타 등으로 학명의 존재를 파악할 수 없는 것이 많았다. 윤조류는 대부분 지리산 고산습지인 왕등재습지, 덕평봉, 외곡습지, 만복대 등에서 관찰된 종류였다.

[표 3] 학명이 검토된 윤조류의 분류체계

Phylum Charophyta Migula
Class Klebsormidiophyceae Hoek, Mann & Jahns
Order Klebsormidiales Stewart & Mattox
Family Klebsormidiaceae K.D.Stewart & K.R.Mattox
<i>Klebsormidium flaccidum</i> (Kützing) Silva, Mattox & Blackwell
<i>Klebsormidium klebsii</i> (Smith) Silva, Mattox & Blackwell

[표 3] 계속

Class Zygnematophyceae Round ex Guiry.
Order Desmidiiales C.E.Bessey
Family Closteriaceae Bessey
<i>Closterium abruptum</i> West & west
<i>Closterium acutum</i> var. <i>linea</i> (Perty) W. West & G.S. West
<i>Closterium acerosum</i> Ehrenberg ex Ralfs
<i>Closterium aciculare</i> T. West
<i>Closterium calosporum</i> Wittrock
<i>Closterium cornu</i> Ehrenberg & Ralfs
<i>Closterium cynthia</i> Notaris
<i>Closterium diana</i> e Ehrenberg ex Ralfs
<i>Closterium diana</i> e var. <i>brevis</i> (S.P. Petkoff) W. Krieger
<i>Closterium ehrenbergii</i> Meneghini & Ralfs
<i>Closterium gracile</i> Brébisson & Ralfs
<i>Closterium kuetzingii</i> Brébisson
<i>Closterium leibleinii</i> Kutzing
<i>Closterium lunula</i> Ehrenberg & Hemprich ex Ralfs
<i>Closterium moniliferum</i> Ehrenberg & Ralfs
<i>Closterium navicula</i> (Brébisson) Lutkemuller
<i>Closterium parvulum</i> Nägeli
<i>Closterium ralfsii</i> Brébisson & Ralfs
<i>Closterium ralfsii</i> var. <i>hybridum</i> Rabenhorst
<i>Closterium rostratum</i> Ehrenberg
<i>Closterium setaceum</i> Ehrenberg
<i>Closterium strigosum</i> Brébisson
<i>Closterium striolatum</i> Ehrenberg & Ralfs
<i>Closterium turgidum</i> var. <i>borgei</i> Deflandre
<i>Closterium venus</i> Kützing
Family Desmidiaceae Ralfs
<i>Arthrodesmus indentatus</i> West & G.S. West
<i>Cosmarium abbreviatum</i> f. <i>pygmae</i> Messikommer
<i>Cosmarium angulosum</i> Brébisson
<i>Cosmarium angulosum</i> var. <i>concinnum</i> (Rabenhorst) West & West
<i>Cosmarium auriculatum</i> Reinsch
<i>Cosmarium australe</i> (Raciborski) Lutkemuller
<i>Cosmarium binum</i> Nordstedt
<i>Cosmarium contratum</i> O. Kirchner
<i>Cosmarium formosulum</i> Hoffmann

[표 3] 계속

<i>Cosmarium granatum</i> Brébisson
<i>Cosmarium laeve</i> Rabenhorst
<i>Cosmarium nymannianum</i> Grumow
<i>Cosmarium obtusatum</i> Schmidle
<i>Cosmarium pseudoexiguum</i> var. <i>retusum</i> Hirano
<i>Cosmarium punctulatum</i> Brébisson
<i>Cosmarium retangulare</i> Grunow
<i>Cosmarium subauriculatum</i> var. <i>truncatum</i> West & West
<i>Cosmarium subcostatum</i> nordstedt
<i>Cosmarium tinctum</i> var. <i>intermedium</i> Ralfs
<i>Cosmarium trilobulatum</i> Reinsch
<i>Desmidium swartzii</i> Agardh
<i>Docidium baculum</i> Brébisson ex Ralfs
<i>Euastrum anastrum</i> Ehrenberg
<i>Euastrum anastrum</i> var. <i>dideltiforme</i> Ducellier
<i>Euastrum insulare</i> (Wittrock) Roy
<i>Hyalotheca dissiliens</i> Brébisson ex Ralfs
<i>Micrasterias</i> cf. <i>apiculata</i>
<i>Micrasterias papillifera</i> var. <i>glabra</i> Nordstedt
<i>Micrasterias rotata</i> (Greville) Ralfs
<i>Micrasterias thomasi</i> var. <i>pulcherrima</i> G.S. West
<i>Spondylosium ellipticum</i> West & West
<i>Spondylosium granulatum</i> Roy and Bisset
<i>Spondylosium planum</i> (Wolle) West & West
<i>Staurastrum ambiguum</i> Turner
<i>Staurastrum arctiscon</i> (Ehrenberg) Lundell
<i>Staurastrum astroideum</i> West & West
<i>Staurastrum chaetoceras</i> (Schröder) G.M. Smith
<i>Staurastrum cingulum</i> (West & G.S. West) G.M. Smith
<i>Staurastrum clevei</i> (Wittrock) J. Roy
<i>Staurastrum dorsidentiferum</i> var. <i>ornatum</i> Grönblad
<i>Staurastrum dorsidentiferum</i> West & West
<i>Staurastrum furcatum</i> Brébisson
<i>Staurastrum glabrum</i> Ralfs
<i>Staurastrum gracile</i> Ralfs
<i>Staurastrum multinodosum</i> Grönblad
<i>Staurastrum natator</i> West
<i>Staurastrum nodulosum</i> Prescott
<i>Staurastrum paradoxum</i> Meyen ex Ralfs

[표 3] 계속

<i>Staurastrum pseudotetracerum</i> var. <i>curvatum</i> Grönblad 1948
<i>Staurastrum quadricornutum</i> Roy & Bisset
<i>Staurastrum stroideum</i> (Nägeki) Archer
<i>Staurastrum tetracerum</i> Ralfs
<i>Staurastrum tetracerum</i> f. <i>trigona</i> Lundell
<i>Staurastrum tetracerum</i> var. <i>subexcavatum</i> Gronblad
<i>Staurastrum tohopekaligense</i> Wolle
<i>Stauroidesmus connatus</i> (Lundell) Thomasson
<i>Stauroidesmus cuspidatus</i> var. <i>divergens</i> Nordstedt
<i>Stauroidesmus extensus</i> (O.F. Andersson) Teiling
<i>Stauroidesmus glaber</i> (Ehrenberg) Teiling
<i>Stauroidesmus grande</i> var. <i>parvum</i> West & West
<i>Stauroidesmus incus</i> (Hassall ex Ralfs) Teiling
<i>Stauroidesmus megacanthus</i> var. <i>orientalis</i> (Scott & Prescott) Teiling
<i>Stauroidesmus ralfsii</i> (West) Tomaszewicz
<i>Stauroidesmus validus</i> (W. et G.S. West) Thomasson
<i>Teingia wallichii</i> var. <i>anglica</i> (West & West) Föster
Family Gonatozygaceae G.S.West
<i>Gonatozygon brebissonii</i> De Bory
<i>Gonatozygon pilosum</i> var. <i>echinatum</i> Krieger
Subclass Zygnematophycidae
Order Zygnematales C.E.Bessey
Family Mesotaeniaceae Oltmanns
<i>Cylindrocystis brebissonii</i> (Ralfs) De Bary
<i>Netrium digitus</i> (Brébisson ex Ralfs) Itzigsohn & Rothe
<i>Netrium digitus</i> var. <i>lamellosum</i> (Brébisson ex Kützing) Grönblad
<i>Planotaenium closterioides</i> G.J.P. Ramos & C.W.N. Moura
<i>Spirotaenia condensata</i> Brébisson
Family Zygnemataceae Kützing
<i>Mougeotia scalaris</i> Hassall
<i>Spirogyra westii</i> Transeau

Ⅰ 남조류

- 남조류는 원래 산소를 발생하는 기능을 가지고 있어 조류(藻類, Algae)의 한 그룹으로 취급하였고 또한 분류계급에서도 Cyanophyta, Cyanoprokaryota 등으로 표기하였다. 현미경 기술과 세포소기관에 대한 지식이 발달하면서 남조류는 세균의 일종으로 확인되었다. 즉 세포소기관은 없고 세포질 주변부로 틸라코이드가 분포하여 광합성 작용을 하며, 세포벽은 펩티도글리칸으로 구성된 그람음성균이다. 따라서 오랜 세월동안 세균학자들과 조류학자들은 남조류의 소속에 대해 많은 논란을 일으켰다. 그러나 생물의 특성을 무시할 수 없기에 남조류의 최상위 계급은 Cyanobacteria로 명명하였다. 이러한 이유와 분자생물학의 발달, DNA 조사기술 및 계통학의 발전으로 인해 남조류는 학명의 변화가 가장 심한 조류 분류군 중의 하나이다.
- 변경된 학명은 *Coelosphaerium naeagerianum* Unger는 *Woronichinia naeagerianum* (Unger) Elenkin, *Gomphosphaeria lacustris* Chodat는 *Snowella lacustris* (Chodat) Komárek & Hindák로 속명이 변경되었고 *Oscillatoria*속은 *Anagnostidinema*, *Kamptonema*, *Jaaginema*, *Oscillatoria*, *Phormidium*, *Pseudanabaena*로 6개의 속으로 분리되거나 일부 종은 *Oscillatoria* 속에 그대로 남았다. *Phormidium*은 *Pseudanabaena*, *Leptolyngbya*로 분리되었고, *Homoeothrix*속의 일부 종은 *Tapinothrix*속으로 분리되었다. *Anabaena*는 *Dolichospermum* 속으로 변경되었다.

[표 4] 학명이 검토된 남조류의 분류체계

Phylum Cyanobacteria Stanier ex Cavalier-Smith
Class Cyanophyceae Schaffner
Subclass Oscillatoriophyceae L.Hoffmann, J.Komárek & J.Kastovsky
Order Chroococcales Schaffner
Family Aphanothecaceae (J.Komárek & Anagnostidis) J.Komárek, J.Kastovsky, Mareš & J.R.Johansen
<i>Aphanothece saxicola</i> Nägeli
Family Chroococcaceae Rabenhorst
<i>Chroococcus limneticus</i> Lemmermann
<i>Chroococcus minutus</i> (Keissler) Lemmermann
<i>Chroococcus turgidus</i> (Kützing) Nägeli
<i>Dactylococcopsis fascicularis</i> Lemmermann
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i> Hansgirg
Family Microcystaceae Elenkin
<i>Microcystis aeruginosa</i> (kützing) Kützing
<i>Microcystis flos-aquae</i> (Wittrock) Kirchner
<i>Microcystis ichthyoblabe</i> Kützing
<i>Microcystis wesenbergii</i> (Komárek) komárek ex Komárek
Subclass Synechococcophycidae L.Hoffmann, J.Komárek & J.Kastovsky
Order Synechococcales L.Hoffmann, J.Komárek & J.Kastovsky
Family Coelosphaeriaceae Elenkin

[표 4] 계속

<i>Coelosphaerium kuetzingianum</i> Nägeri
<i>Snowella lacustris</i> (Chodat) Komárek & Hindák
<i>Woronichinia naegerianum</i> (Unger) Elenkin
Family Leptolyngbyaceae (Anagnostidis & J.Komárek) J.Komárek, J.Kastovsky, Mareš & J.R.Johansen
<i>Tapinothrix janthina</i> (Bornet & Flahault) Bohunická & J.R.Johansen
<i>Tapinothrix varians</i> (Geitler) Bohunická & J.R.Johansen
Family Merismoperiaceae Elenkin
<i>Aphanocapsa delicatissima</i> West & West
<i>Aphanocapsa conferta</i> (West & G.S.West) Komárková-Legnerová & Cronberg
<i>Aphanocapsa rivularis</i> (Carmichael) Rabenhorst
<i>Limnococcus limneticus</i> (Lemmermann) Komárková, Jezberová, O.Komárek & Zapomelová
<i>Merismopedia elegans</i> Braun ex Kützing
<i>Merismopedia glauca</i> (Nägeli) Drouet & Daily
<i>Merismopedia tenuissima</i> Lemmermann
Family Pseudanabaenaceae K.Anagnostidis & J.Komárek
<i>Pseudanabaena catenata</i> Lauterborn
<i>Pseudanabaena limnetica</i> (Lemmermann) Komárek
<i>Pseudanabaena mucicola</i> (Naumann & Huber-Pestalozzi) Schwabe
Subclass Oscillatoriophycidae L.Hoffmann, J.Komárek & J.Kastovsky
Order Oscillatoriales Schaffner
Family Homoeotrichaceae
<i>Homoeothrix juliana</i> (Bornet & Flahault ex Gomont) Kirchner
<i>Homoeothrix thermalis</i> Emoto & Hirose
Family Microcoleaceae O.Strunecký, J.R.Johansen & J.Komárek
<i>Kamptonema chlorinum</i> (Kützing ex Gomont) Strunecký, Komárek & J.Smarda
<i>Kamptonema okenii</i> (C.Agardh ex Gomont) Strunecký, Komárek & J.Smarda
Family Oscillatoriaceae Engler
<i>Anagnostidinema amphibium</i> (C.Agardh ex Gomont) Strunecký, Bohunická, J.R. Johansen & J.Komárek
<i>Homoeothrix thermalis</i> Emoto & Hirose
<i>Jaaginema angustissimum</i> (West & G.S.West) Anagnostidis & Komárek
<i>Jaaginema geminatum</i> (Schwabe ex Gomont) Anagnostidis & Komárek
<i>Jaaginema profundum</i> (Schröter & Kirchner) Anagnostidis & Komárek
<i>Leptolyngbya lurida</i> (Gomont) Anagnostidis & Komárek
<i>Leptolyngbya orientalis</i> (G.S.West) Anagnostidis & Komárek
<i>Leptolyngbya tenuis</i> (Gomont) Anagnostidis & Komárek
<i>Leptolyngbya treleasei</i> (Gomont) Anagnostidis & Komárek
<i>Leptolyngbya valderiana</i> (Gomont) Anagnostidis & Komárek
<i>Oscillatoria curviceps</i> C. Agardh ex Gomont
<i>Oscillatoria limosa</i> C. Agardh ex Gomont
<i>Oscillatoria planctonica</i> Woloszynska
<i>Oscillatoria quasiperforata</i> var. <i>crassa</i> Y .Emoto & H.Hirose
<i>Oscillatoria tenuis</i> C. Agardh ex Gomont

[표 4] 계속

Family Phormidiaceae Anagnostidis & Komárek
<i>Microcoleus amoenus</i> (Gomont) Strunecky, Komárek & J.R.Johansen
<i>Phormidium allorgei</i> (Frémy) Anagnostidis & Komárek
<i>Phormidium corium</i> Gomont ex Gomont
<i>Phormidium irriguum</i> (Kützing ex Gomont) Anagnostidis & Komárek
<i>Phormidium lucidum</i> Kützing ex Gomont
<i>Phormidium nigroviride</i> (Thwaites ex Gomont) Anagnostidis & Komárek
<i>Phormidium nigrum</i> (Vaucher ex Gomont) Anagnostidis & Komárek
<i>Phormidium purpurascens</i> (Kützing) Gomont
<i>Phormidium rertzii</i> (Agardh) Gomont ex Gomont
<i>Phormidium subterraneum</i> var. <i>crassum</i> Emoto & Hirose
<i>Phormidium uncinatum</i> Gomont ex Gomont
<i>Planktolyngbya contorta</i> (Lemmermann) Anagnostidis & Komárek
<i>Planktolyngbya limnetica</i> (Lemmermann) Komárková-Legnerová & Cronberg
<i>Planktothrix agardhii</i> (Gomont) Anagnostidis & Komárek
<i>Potamolinea aerugineocaerulea</i> (Gomont) M.D.Martins & L.H.Z.Branco
Order Spirulinales J.Komárek, J.Kastovsky, Mareš & J.R.Johansen
Family Spirulinaceae (Gomont) L.Hoffmann, J.Komárek & J.Ka
<i>Spirulina laxa</i> G.M.Smith
<i>Spirulina major</i> Kützing ex Gomont
Subclass Nostocophycidae Hoffmann, Komárek & Kastovsky
Order Nostocales Borzi
Family Aphanizomenonaceae Elenkin
<i>Aphanizomenon flos-aquae</i> Ralfs ex Bornet & Flahault
<i>Dolichospermum affine</i> (Lemmermann) Wacklin, L.Hoffmann & Komárek
<i>Dolichospermum circinale</i> (Rabenhorst ex Bornet & Flahault) P. Wacklin, L. Hoffmann & J. Komárek
<i>Dolichospermum crassum</i> (Lemmermann) P.Wacklin, L.Hoffmann & J.Komárek
<i>Dolichospermum planctonicum</i> (Brunnthaler) Wacklin, L.Hoffmann & Komárek
<i>Dolichospermum smithii</i> (Komárek) Wacklin, L.Hoffmann & Komárek
Family Calothricaceae
<i>Calothrix fusca</i> Bornet & Flahault
<i>Calothrix parietina</i> Thuret ex Bornet & Flahault
Family Nostocaceae Eichler
Anabaena cf. <i>affinis</i>
<i>Nostoc linckia</i> Bornet ex Bornet & Flahault
Family Rivulariaceae Bornet & Flahault
<i>Microchaeta tenera</i> Thurst ex Bornet et Flahault

Ⅰ 유글레나조류

- Euglena fusiformis* H.J Carter는 *Lepocinclis fusiformis* (H.J.Carter) Lemmermann, *Euglena limnophila* Lemmermann는 *Phacus limnophilus* (Lemmermann) E.W.Linton & A.Karnkowska-Ishikawa, *Euglena spathirhyncha* Skuja는 *Discoplastis spathirhyncha* (Skuja) Triemer, *Euglena spirogyra* Ehrenberg는 *Lepocinclis spirogyroides* B.Marin & Melkonian, *Lepocinclis pseudowirenkoi* Prescott는 *Phacus pseudowirenko* Prescott, *Lepocinclis reeuwykiana* W.Conrad는 *Monomorphina reeuwykiana* (Conrad) Marin & Melkonian, *Phacus pyrum* (Ehrenberg) W. Archer는 *Monomorphina pyrum* (Ehrenberg) Mereschkowsky로 학명이 변경되었다. *Phacus agilis* var. *okobojiensis* Allegre & Jahn는 *Cryptoglana skujae* var. *okobojiensis* Marin & Melkonianf 학명이 변경되어 Phacidae 과에서 Euglenidae 과로 이전되었고, *Menoidium pellucidum* Perty는 Euglenidae 과에서 Peranemea 강으로 상위계급이 변경되었다.

[표 5] 학명이 검토된 유글레나조류의 분류체계

Phylum Euglenozoa
Class Euglenophyceae
Subclass Euglenophycidae Busse & Preisfeld
Order Euglenida F.Stein
Family Euglenidae Dujardin
<i>Cryptoglana skujae</i> var. <i>okobojiensis</i> Marin & Melkonian
<i>Euglena agilis</i> H.J. Cater
<i>Euglena deses</i> Ehrenberg
<i>Euglena ehrenbergii</i> G.A. klebs
<i>Euglena gracilis</i> G.A. Klebs
<i>Euglena granulata</i> (G.A.Klebs) F.Schmitz
<i>Euglena hemichromata</i> Skuja
<i>Euglena minima</i> Francé
<i>Euglena pascheri</i> Swirenko
<i>Euglena repulsans</i> J. Schiller
<i>Euglena sanguinea</i> Ehrenberg
<i>Euglena subehrenbergii</i> Skuja
<i>Euglena texta</i> (Dujardin) Hübner
<i>Euglena viridis</i> (Müller) Ehrenberg
<i>Eugleniformis proxima</i> (Dangeard) Bennett & Triemer
<i>Monomorphina nordstedtii</i> (Lemmermann) Popova
<i>Monomorphina pyrum</i> (Ehrenberg) Mereschkowsky
<i>Monomorphina reeuwykiana</i> (Conrad) Marin & Melkonian
<i>Strombomonas acuminata</i> (Schmarda) Deflandre
<i>Strombomonas borysteniensis</i> (Roll) Popowa

[표 5] 계속

<i>Strombomonas eurystoma</i> (F. Stein) T.G. Popova
<i>Strombomonas ginlingensis</i> (C.C. Wang & D.S. Nie) Z.X. Shi & Q.X. Wang in Shi et al
<i>Strombomonas ovalis</i> (Playfair) Deflandre
<i>Strombomonas triquetra</i> (Playfair) Deflandre
<i>Strombomonas urcelolata</i> (Stokes) Deflandre
<i>Trachelomonas abrupta</i> Swirenko
<i>Trachelomonas abrupta</i> var. <i>minor</i> Deflandre
<i>Trachelomonas allia</i> Drezepolski
<i>Trachelomonas armata</i> (Ehrenberg) Stein
<i>Trachelomonas bacillifera</i> Playfair
<i>Trachelomonas cervicula</i> Stokes
<i>Trachelomonas crebea</i> Kellicot
<i>Trachelomonas cylindrica</i> Ehrenberg
<i>Trachelomonas hexangulata</i> Swirenko
<i>Trachelomonas hispida</i> (Perty) Stein
<i>Trachelomonas hispida</i> var. <i>coronata</i> Lemmermann
<i>Trachelomonas hispida</i> var. <i>crenulatocollis</i> (Maskell) Lemmermann
<i>Trachelomonas intermedia</i> Dangeard
<i>Trachelomonas klebsii</i> Deflandre
<i>Trachelomonas komarowii</i> var. <i>punctata</i> Skvortzov
<i>Trachelomonas lacustris</i> var. <i>ovalis</i> Drezepolski
<i>Trachelomonas mirabilis</i> Swirenko
<i>Trachelomonas mirabilis</i> var. <i>affinis</i> Skvortzov
<i>Trachelomonas oblonga</i> Lemmermann
<i>Trachelomonas oblonga</i> var. <i>attenuata</i> Playfair
<i>Trachelomonas oblonga</i> var. <i>australica</i> Playfair
<i>Trachelomonas planctonica</i> Swirenko
<i>Trachelomonas robusta</i> Swirenko
<i>Trachelomonas similis</i> Stokes
<i>Trachelomonas sydneyensis</i> Playfair
<i>Trachelomonas sydneyensis</i> var. <i>obesa</i> Playfair
<i>Trachelomonas volvocina</i> Ehrenberg
<i>Trachelomonas woycickii</i> Koczwara
Family Phacidae J.I.Kim, Triemer & W. Shin
<i>Discoplastis spathirhyncha</i> (Skuja) Triemer
<i>Lepocinclis acuminata</i> Deflandre
<i>Lepocinclis acus</i> (O.F. Müller) B.Marin & Melkonian
<i>Lepocinclis fusiformis</i> (H.J. Carter) Lemmermann
<i>Lepocinclis globulus</i> Perty
<i>Lepocinclis ovum</i> (Ehrenberg) Lemmermann

[표 5] 계속

<i>Lepocinclis ovum</i> var. <i>dimidiominor</i> (Deflandre) Conrad
<i>Lepocinclis oxyuris</i> (Schmarda) B.Marin & Melkonian
<i>Lepocinclis salina</i> Fritsch
<i>Lepocinclis spirogyroides</i> B. Marin & Melkonian in Marin et al
<i>Lepocinclis tripteris</i> (Dujardin) B. Marin & Melkonian
<i>Phacus acuminatus</i> Stokes
<i>Phacus acuminatus</i> var. <i>drezpolskii</i> Skvortzov
<i>Phacus anacoelus</i> Stokes
<i>Phacus caudatus</i> Hübner
<i>Phacus caudatus</i> var. <i>ovalis</i> Drezepolski
<i>Phacus circulatus</i> Pochmann
<i>Phacus curvicauda</i> Swirenko
<i>Phacus heimii</i> Lefèvre
<i>Phacus helicoides</i> Pochmann
<i>Phacus inflexus</i> (kisselev) Pochmann
<i>Phacus limnophilus</i> (Lemmermann) E.W.Linton & A.Karnkowska-Ishikawa
<i>Phacus longicauda</i> (Ehrenberg) Dujardin
<i>Phacus longicauda</i> var. <i>undulatus</i> Skvortzov
<i>Phacus meson</i> Pochmann
<i>Phacus orbicularis</i> K.Hübner
<i>Phacus oscillans</i> G.A. Klebs
<i>Phacus pisiformis</i> Shi
<i>Phacus pleuronectes</i> (Müller) Nitzsch ex Dujardin
<i>Phacus pseudoswirenkoii</i> Prescott
<i>Phacus raciborskii</i> Drezepolski
<i>Phacus smulkowskianus</i> (Zakryś) W.-H.Kusber
<i>Phacus striatus</i> Francè
<i>Phacus tortus</i> (Lemmermann) Skvortzov
<i>Phacus trigueter</i> (Ehrenberg) Perty
<i>Phacus trimarginatus</i> Allegre & Jahn
<i>Phacus unguis</i> Pochm
.
Superclass Spirocuta
Class Peranemea
Subclass Anisonemia
Order Natomonadida
Suborder Rhabdomonadina
Family Astasiidae
<i>Menoidium pellucidum</i> Perty
.

[표 5] 계속

Superclass Rigimonada
Class Stavomonadea
Subclass Homostavia
Order Petalomonadida
Family Scytomonadidae
<i>Calycimonas physaloides</i> H.R. Christen

▮ 대롱편모조류

- ▣ 대롱편모조류의 학명은 변화가 없었고, 중복종만 제거하였다.

[표 6] 학명이 검토된 대롱편모조류의 분류체계

Phylum Ochrophyta Cavalier-Smith 대롱편모조류
Class Chrysophyceae Pascher 황갈조강
Order Chromulinales Pascher 돋보기말목
Family Chrysococcaceae
<i>Phaeosphaera gelatinosa</i> West & G.S.West
Family Dinobryaceae Ehrenberg 나팔말과
<i>Dinobryon bavaricum</i> Imhof
<i>Dinobryon cylindricum</i> Imhof
<i>Dinobryon cylindricum</i> var. <i>palustre</i> Lemmermann
<i>Dinobryon divergens</i> Imhof
<i>Dinobryon sertularia</i> Ehrenberg
<i>Dinobryon sociale</i> (Ehrenberg) Ehrenberg
Family Chrysosphaeraceae
<i>Chrysosphaera nitens</i> Pascher
Order Hibberdiales Andersen
Family Stylococcaceae Lemmermann
<i>Lagynion ampullaceum</i> (Stokes) Pascher
<i>Lagynion macrotrachelum</i> (Stokes) Rascher
<i>Lagynion scherffellii</i> Pascher
Class Synurales Andersen 시누라조강
Order Synurales
Family Mallomonadaceae Diesing
<i>Mallomonas akrokomos</i> Ruttner
<i>Mallomonas tonsurata</i> Teiling

[표 6] 계속

Family Synuraceae Lemmermann
<i>Synura petersenii</i> Korshikov
Class Xanthophyceae Allorge ex Frisch 황녹조강
Order Mischococcales Fritsch
Family Botryochloridaceae Pascher
<i>Chlorellidiopsis separabilis</i> Pascher
Family Gloeobotrydaceae Pascher
<i>Gloeobotrys limneticus</i> (G.M. Smith) Pascher

Ⅰ **와편모조류**

- *Peridinium aciculiferum* Lemmermann는 *Apocalathium aciculiferum* (Lemmermann) Craveiro, Daugbjerg, Moestrup & Calado로 속명이 변경되었다. *Peridinium inconspicuum* Lemmermann와 *Peridinium marchicum* Lemmermann는 학명이 합쳐져 *Parvodinium inconspicuum* (Lemmermann) Carty으로 학명이 변경되었다. 이에 따라 새로운 Thoracosphaerales이 새롭게 설정되었으며 *Apocalathium aciculiferum* (Lemmermann) Craveiro, Daugbjerg, Moestrup & Calado 이 이 목에 포함된다.

[표 7] 학명이 검토된 와편모조류의 분류체계

Phylum Miozoa (미오동물문)
Superclass Dinoflagellata
Class Dinophyceae
Order Peridiniales Haeckel
Family Peridiaceae Ehrenberg
<i>Parvodinium inconspicuum</i> (Lemmermann) Carty
<i>Peridinium bipes</i> Stein
<i>Peridinium gatunense</i> Nygaard
<i>Peridinium volzii</i> Lemmermann
<i>Peridinium willei</i> Huitfeid-Kaas
Order Thoracosphaerales
Family Thoracosphaeraceae
<i>Apocalathium aciculiferum</i> (Lemmermann) Craveiro, Daugbjerg, Moestrup & Calado
Order Gonyaulacales F.J.R. Taylor
Family Ceratiaceae Kofoid
<i>Ceratium hirundinella</i> (O.F. Müller) Dujardin

| 은편모조류

- *Chroomonas acuta* Uermühl.는 *Komma caudata* (L.Geitler) D.R.A.Hill로 속명이 변경되었으며, *Plagioselmis nanoplanctonica* (Skuja) Novarino, Lucas et Morrall는 목 소속이 변경되어 Pyrenomonadales 목으로 이전되었다.

[표 8] 학명이 검토된 은편모조류의 분류체계

Phylum Cryptophyta Cavalier-Smith
Class Cryptophyceae F.E.Fritsch
Order Cryptomonadales Pascher, Pringsheim
Family Cryptomonadaceae Ehrenberg
<i>Cryptomonas erosa</i> Ehrenberg
<i>Cryptomonas marssonii</i> Skuja
<i>Cryptomonas ovata</i> Ehrenberg
<i>Cryptomonas reflexa</i> Skuja
.
Family Hemiselmidaceae Butcher ex P.C.Silva
Chroomonas cf. acuta
<i>Komma caudata</i> (L.Geitler) D.R.A.Hill
.
Order Pyrenomonadales G.Novarino & I.A.N.Lucas
Family Geminigeraceae B.L.Clay, P.Kugrens & R.E.Lee
<i>Plagioselmis nanoplanctica</i> (Skuja) Novarino, Lucas et Morrall
.
Family Pyrenomonadaceae G.Novarino & I.A.N.Lucas
<i>Rhodomonas lens</i> Pascher & Ruttner

| 규조류

- 규조류는 담수조류 중 가장 많은 종이 분포하고 있고, 대부분의 장소에 서식하고 있다. 규조류 역시 학명의 변동이 매우 심하게 받았다. 그 이유는 규조류의 화석자료가 풍부하게 연구되어 기존의 학명으로 분류하기 어려운 종류가 계속 발견되었고 또한 과거 생물현미경으로 탐지하지 못한 미세한 세포벽의 구조에 대해 전자현미경의 도움으로 많이 밝혀짐에 따라 학명의 조합, 이전 새로운 속명의 설정 등 학명의 변경이 많이 발생하였다.
- *Fragilaria vaucheriae* var. *capitellata* (Grunow) Ross는 *Fragilaria recapitellata* Lange-Bertalot & Metzeltin in Metzeltin, Lange-Bertalot & Nergui, *Fragilaria vaucheriae* var. *parvula* (Kützing) A. Cleve는 *Fragilaria vaucheriae* (Kützing) J.B.Petersen로 학명이 변경되었고 *Synedra delicatissima* var. *angustissima* Grunow in Van Heurck는 *Ulnaria delicatissima* var. *angustissima* (Grunow) Aboal & P.C.Silva, *Synedra fasciculata* (Agardh) Kützing는 *Tabularia fasciculata* (C.Agardh)

D.M.Williams & Round로 속명의 신설 및 변경되었다. 특히 *Achnanthes* 속은 *Achnantidium*, *Achnanthes*, *Lemnicola*, *Psammothidium*, *Planothidium* 등 여러 속이 신설되었다. 그리고 *Fragilaria*와 *Synedra* 속에서도 일부 종은 *Ulnaria* 속이 신설되어 이전되는 등 많은 변화가 현재 진행중에 있다. 특히 *Achnanthes* 속과 *Fragulakaria* 속의 종들은 현재 국립공원지역에 가장 많이 출현하는 매우 중요한 분류군이다. 규조류는 생태학적 연구에서 매우 중요한 분류군이다. 특히 호수, 강 등의 수환경 건강성 조사에서 반드시 조사해야하는 기본 분류군이다. 현재 진행중인 새로운 속으로 변경할 경우 많은 혼란을 가중할 수 있다. 특히 국내의 경우 담수조류 학자가 거의 없는 상태에서 생소한 속으로 종동정이 진행될 경우 현재 적용중인 수질 지수를 이용한 평가에 많은 혼란이 불가피하다. 그리고 현재 국립생물자원관에서 제공되는 국가생물종목록에는 변경된 종명이 아닌 변경전의 학명을 제공하고 있다. 국립생물자원관에서는 담수조류의 학명 사용에 문제점이 있음을 인식하고 새로운 학명을 적용하기 위한 과제를 시도할 예정이다. 부착규조는 생태적 연구 특히 수질평가에 가장 중요한 분류군이므로 급격한 학명 변경이 혼란을 일으킬 수 있으므로 가장 일반적으로 사용하는 하는 학명은 그대로 활용하고 모든 규조류의 학명 검토는 새롭게 정리된 국가생물종목록이 발표되면 그 이후 정리하는 것이 타당할 것이다.

[표 9] 학명이 검토된 규조류의 분류체계

Phylum Bacillariophyta 돌말식물문
Subphylum Coscinodiscophytina)
Class Coscinodiscophyceae 체돌말강
Order Aulacoseirales
Family Aulacoseiraceae
<i>Aulacoseira alpigena</i> (Grunow) Krammer
<i>Aulacoseira ambigua</i> (Grunow) Simonsen
<i>Aulacoseira ambigua</i> f. <i>japonica</i> Tuji & D.M.Williams
<i>Aulacoseira distans</i> (Ehrenberg) Simonsen
<i>Aulacoseira granulata</i> (Ehrenberg) Simonsen
<i>Aulacoseira granulata</i> f. <i>spiralis</i> (Hustedt) D.B.Czarnecki & D.C.Reinke
<i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i> (O.Müller) Simonsen
<i>Aulacoseira italica</i> (Ehrenberg) Simonsen
<i>Aulacoseira muzzanensis</i> (F.Meister) Krammer
Order Rhizosoleniales
Family Rhizosoleniaceae
<i>Rhizosolenia eriensis</i> H.L.Smith
<i>Rhizosolenia longiseta</i> O.Zacharias
<i>Rhizosolenia setigera</i> Brightwell
Subclass Melosirophyceae

[표 9] 계속

Family Melosiraceae
<i>Melosira islandica</i> O.Müller
<i>Melosira islandica</i> subsp. <i>helvetica</i> O.Müller
<i>Melosira nummuloides</i> C.Agardh
<i>Melosira undulata</i> (Ehrenberg) Kützing
<i>Melosira varians</i> C.Agardh
Family Orthoseiraceae
<i>Orthoseira roeseana</i> (Rabenhorst) Pfitzer
Class Mediophyceae
Subclass Chaetocerotophycidae
Order Chaetocerotales
Family Chaetocerotaceae
<i>Acanthoceras zachariasii</i> (Brun) Simonsen
<i>Chaetoceros gracilis</i> Pantocsek
Family Leptocylindraceae
<i>Leptocylindrus urvatus</i> Skvortsov
Subclass Thalassiosirophyceidae
Order Eupodiscales 눈돌말목
Family Eupodiscaceae
<i>Pleurosira laevis</i> (Ehrenberg) Compère
Order Stephanodiscales 고리돌기돌말목
Family Stephanodiscaceae
<i>Cyclostephanos dubius</i> (Hustedt) Round in Theriot & al.
<i>Cyclotella atomus</i> Hustedt
<i>Cyclotella comta</i> Kützing
<i>Cyclotella fottii</i> Hustedt in Huber-Pestalozzi
<i>Cyclotella meneghiniana</i> Kützing
<i>Cyclotella ocellata</i> Pantocsek
<i>Cyclotella operculata</i> (C.Agardh) Brébisson
<i>Cyclotella pseudostelligera</i> Hustedt
<i>Cyclotella radiosa</i> (Grunow) Lemmermann
<i>Cyclotella stelligera</i> (Cleve & Grunow) Van Heurck
<i>Cyclotella stelligeroides</i> Hustedt
<i>Stephanodiscus hantzschii</i> Grunow in Cleve & Grunow
Order Thalassiosirales 끈원반돌말목

[표 9] 계속

Family Thalassiosiraceae
<i>Thalassiosira bramaputrae</i> (Ehrenberg) Håkansson & Locker
Subphylum Bacillariophytina 돌말식물아문
Class Bacillariophyceae 돌말강
Subclass Bacillariophycidae 원시배선구조아강
Order Bacillariales 옷돌말목
Family Bacillariaceae
<i>Bacillaria paradoxa</i> J.F.Gmelin in Linnaeus
<i>Denticula elegans</i> Kützing
<i>Denticula kuetzingii</i> Grunow
<i>Denticula tenuis</i> Kützing
<i>Hantzschia amphioxys</i> (Ehrenberg) Grunow in Cleve & Grunow
<i>Nitzschia acicularis</i> (Kützing) W.Smith
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow
<i>Nitzschia amphibioides</i> Hustedt
<i>Nitzschia brevissima</i> Grunow in Van Heurck
<i>Nitzschia bryophila</i> (Hustedt) Hustedt
<i>Nitzschia calida</i> Grunow in Cleve & Grunow
<i>Nitzschia clausii</i> Hantzsch
<i>Nitzschia dissipata</i> (Kützing) Rabenhorst
<i>Nitzschia divergens</i> Hustedt
<i>Nitzschia diversa</i> Hustedt
<i>Nitzschia filiformis</i> (W.Smith) Van Heurck
<i>Nitzschia fonticola</i> (Grunow) Grunow in Van Heurck
<i>Nitzschia frustulum</i> (Kützing) Grunow in Cleve & Grunow
<i>Nitzschia fruticosa</i> Hustedt
<i>Nitzschia gessneri</i> Hustedt
<i>Nitzschia gracilis</i> Hantzsch
<i>Nitzschia hantzschiana</i> Rabenhorst
<i>Nitzschia inconspicua</i> Grunow
<i>Nitzschia intermedia</i> Hantzsch in Grunow
<i>Nitzschia levidensis</i> (W.Smith) Grunow in Van Heurck
<i>Nitzschia levidensis</i> var. <i>victoriae</i> (Grunow) Cholnoky
<i>Nitzschia linearis</i> W.Smith
<i>Nitzschia linearis</i> var. <i>subtilis</i> Hustedt
<i>Nitzschia longissima</i> var. <i>reversa</i> Grunow in Cleve & Grunow
<i>Nitzschia microcephala</i> Grunow in Cleve & Grunow
<i>Nitzschia nana</i> Grunow in Van Heurck
<i>Nitzschia obtusa</i> var. <i>schweinfurthii</i> Grunow in Cleve & Grunow
<i>Nitzschia palea</i> (Kützing) W.Smith

[표 9] 계속

<i>Nitzschia palea</i> var. <i>debilis</i> (Kützing) Grunow
<i>Nitzschia paleacea</i> (Grunow) Grunow in Van Heurck
<i>Nitzschia perminuta</i> (Grunow) M.Peragallo
<i>Nitzschia recta</i> Hantzsch ex Rabenhorst
<i>Nitzschia sigmoidea</i> (Nitzsch) W.Smith
<i>Nitzschia sinuata</i> (Thwaites) Grunow
<i>Nitzschia sinuata</i> var. <i>delognei</i> (Grunow) Lange-Bertalot
<i>Nitzschia sinuata</i> var. <i>tabellaria</i> (Grunow) Grunow in Van Heurck
<i>Nitzschia subacicularis</i> Hustedt
<i>Nitzschia tabellaria</i> (Grunow) Grunow in Cleve & Grunow
<i>Nitzschia thermalis</i> (Ehrenberg) Auerswald in Rabenhorst
<i>Nitzschia tubicola</i> Grunow in Cleve & Grunow
<i>Nitzschia umbonata</i> (Ehrenberg) Lange-Bertalot
Order Cocconeidales 날알돌말목
Family Achnanthidiaceae
<i>Achnanthes alteragracillima</i> Lange-Bertalot
<i>Achnanthes atomus</i> Husted
<i>Achnanthes bioretii</i> H.Germain
<i>Achnanthes brevipes</i> C.Agardh
<i>Achnanthes catenata</i> Bily & Marvan
<i>Achnanthes clevei</i> Grunow in Cleve & Grunow
<i>Achnanthes coarctata</i> (Brébisson ex W.Smith) Grunow in Cleve & Grunow
<i>Achnanthes conspicua</i> Ant.Mayer
<i>Achnanthes convergens</i> H.Kobayasi ex H.Kobayshi, Nagumo & Mayama
<i>Achnanthes crassa</i> Hustedt
<i>Achnanthes crenulata</i> Grunow in Cleve & Grunow
<i>Achnanthes delicatula</i> subsp. <i>engelbrechtii</i> (Cholnoky) Lange-Bertalot
<i>Achnanthes delicatula</i> (Kützing) Grunow in Van Heurck
<i>Achnanthes exigua</i> Grunow in Cleve & Grunow
<i>Achnanthes exigua</i> var. <i>elliptica</i> Hustedt
<i>Achnanthes expressa</i> J.R.Carter in Hartley, Ross & Williams
<i>Achnanthes grana</i> M.H.Hohn & Hellerman
<i>Achnanthes hungarica</i> (Grunow) Grunow in Cleve & Grunow
<i>Achnanthes inflata</i> (Kützing) Grunow
<i>Achnanthes japonica</i> H.Kobayasi ex H.Kobayasi, T.Nagumo & S.Mayama
<i>Achnanthes laevis</i> Østrup
<i>Achnanthes anceolata</i> (Brébisson ex Kützing) Grunow in Van Heurck
<i>Achnanthes lanceolata</i> subsp. <i>frequentissima</i> Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Achnanthes lanceolata</i> var. <i>rostrata</i> Hustedt
<i>Achnanthes lapidosa</i> Krasske

[표 9] 계속

<i>Achnanthes laterostrata</i> Hustedt
<i>Achnanthes lutheri</i> Hustedt
<i>Achnanthes microcephala</i> (Kützing) Grunow
<i>Achnanthes minutissima</i> Kützing
<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>gracillima</i> (Meister) Lange-Bertalot
<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>jackii</i> (Rabenhorst) Lange-Bertalot & Ruppel
<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>robusta</i> Hustedt
<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>saprophila</i> H.Kobayasi & Mayama
<i>Achnanthes minutissima</i> var. <i>scotica</i> (Carter) Lange-Bertalot in Lange-Bertalot & Krammer
<i>Achnanthes oblongella</i> Østrup
<i>Achnanthes pseudoswazii</i> J.R.Carter
<i>Achnanthes rupestoides</i> M.H.Hohn
<i>Achnanthes sacculus</i> J.R.Carter in J.R.Carter & Bailey-Watts
<i>Achnanthes saxonica</i> Krasske ex Hustedt
<i>Achnanthes</i> sp.
<i>Achnanthes subatomoides</i> (Hustedt) Lange-Bertalot & Archibald in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Achnanthes subhudsonis</i> Hustedt
.
Family Cocconeidaceae
<i>Cocconeis pediculus</i> Ehrenberg
<i>Cocconeis placentula</i> Ehrenberg
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i> (Ehrenberg) Grunow
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>clinoraphis</i> Geitler
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>lineata</i> (Ehrenberg) Van Heurck
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>rouxii</i> (Héribaud-Joseph & Brun) Cleve
.
Order Cymbellales 반달돌말목
Family Anomoeoneidaceae
<i>Anomoeoneis brachysira</i> (Brébisson ex Rabenhorst) Cleve
<i>Anomoeoneis gomphonemacea</i> (Grunow) H.Kobayashi
<i>Anomoeoneis irawanae</i> Podzorski & Håkansson
<i>Anomoeoneis serians</i> var. <i>brachysira</i> (Brébisson ex Rabenhorst) Hustedt
<i>Anomoeoneis vitrea</i> (Grunow) R.Ross in Patrick & Reimer
.
Family Cymbellaceae
<i>Cymbella affinis</i> Kützing
<i>Cymbella aspera</i> (Ehrenberg) Cleve
<i>Cymbella cistula</i> (Ehrenberg) O.Kirchner
<i>Cymbella delicatula</i> Kützing
<i>Cymbella gaeumannii</i> Meister
<i>Cymbella gracilis</i> (Rabenhorst) Cleve

[표 9] 계속

<i>Cymbella hillardii</i> Manguin ex Kociolek & Reviere
<i>Cymbella japonica</i> Reichelt in Kuntze
<i>Cymbella lacustris</i> (C.Agardh) Cleve
<i>Cymbella lanceolata</i> (C.Agardh) C.Agardh
<i>Cymbella leptoceros</i> (Ehrenberg) Kützing
<i>Cymbella mesiana</i> Cholnoky
<i>Cymbella microcephala</i> Grunow in Van Heurck
<i>Cymbella minuta</i> f. <i>latens</i> (Krasske) C.W.Reimer in Patrick & Reimer
<i>Cymbella minuta</i> Hilse in Rabenhorst
<i>Cymbella muelleri</i> Hustedt
<i>Cymbella naviculiformis</i> Auerswald ex Heiberg
<i>Cymbella orientalis</i> J.H.Lee in J.H.Lee, T.Gotoh & J.Chung
<i>Cymbella perpusilla</i> Cleve-Euler
<i>Cymbella silesiaca</i> Bleisch in Rabenhorst
<i>Cymbella subaequalis</i> Grunow in Van Heurck
<i>Cymbella tumida</i> (Brébisson) Van Heurck
<i>Cymbella tumidula</i> Grunow in A.W.F.Schmidt
<i>Cymbella turgidula</i> Grunow in A.W.F.Schmidt
<i>Cymbella turgidula</i> var. <i>nipponica</i> Skvortsov
Family Gomphonemataceae
<i>Encyonema cespitosum</i> Kützing
<i>Gomphonema acuminatum</i> Ehrenberg
<i>Gomphonema affine</i> Kützing
<i>Gomphonema angustatum</i> (Kützing) Rabenhorst
<i>Gomphonema angustivalva</i> E.Reichardt
<i>Gomphonema angustum</i> C.Agardh
<i>Gomphonema augur</i> Ehrenberg
<i>Gomphonema augur</i> var. <i>gautieri</i> Van Heurck
<i>Gomphonema augur</i> var. <i>turris</i> (Ehrenberg) Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Gomphonema biceps</i> F. Meister
<i>Gomphonema brebissonii</i> Kützing
<i>Gomphonema clavatum</i> Ehrenberg
<i>Gomphonema clevei</i> Fricke in A.W.F.Schmidt
<i>Gomphonema constrictum</i> Ehrenberg in Kützing
<i>Gomphonema globiferum</i> Meister
<i>Gomphonema gracile</i> Ehrenberg
<i>Gomphonema hebridense</i> W.Gregory
<i>Gomphonema inaequilongum</i> (H.Kobayasi) H.Kobayasi & S.Mayama in S.Mayama & al.
<i>Gomphonema intricatum</i> Kützing
<i>Gomphonema lagenula</i> Kützing

[표 9] 계속

<i>Gomphonema micropus</i> Kützing
<i>Gomphonema minutissimum</i> Greville
<i>Gomphonema minutum</i> (C.Agardh) C.Agardh
<i>Gomphonema nipponicum</i> Skvortsov
<i>Gomphonema olivaceoides</i> Hustedt
<i>Gomphonema olivaceum</i> (Hornemann) Ehrenberg
<i>Gomphonema olivaceum</i> var. <i>minutissimum</i> Hustedt
<i>Gomphonema parvulum</i> (Kützing) Kützing
<i>Gomphonema parvulum</i> var. <i>exilissimum</i> Grunow in Van Heurck
<i>Gomphonema pseudoaugur</i> Lange-Bertalot
<i>Gomphonema pseudosphaerophorum</i> H.Kobayasi in Ueyama & H.Kobayashi
<i>Gomphonema pumilum</i> (Grunow) E.Reichardt & Lange-Bertalot
<i>Gomphonema pumilum</i> var. <i>rigidum</i> E.Reichardt & Lange-Bertalot
<i>Gomphonema quadripunctatum</i> (Østrup) Wislouch
<i>Gomphonema rhombicum</i> Fricke in A.W.F.Schmidt
<i>Gomphonema sphaerophorum</i> Ehrenberg
<i>Gomphonema stauroneiforme</i> Grunow
<i>Gomphonema subtile</i> Ehrenberg
<i>Gomphonema truncatum</i> Ehrenberg
<i>Gomphonema vastum</i> Hustedt
<i>Reimeria sinuata</i> (W.Gregory) Kociolek & Stoermer
Family Rhoicospheniaceae
<i>Rhoicosphenia abbreviata</i> (C.Agardh) Lange-Bertalot
Order Naviculales 쪽배돌말목
Suborder Neidiineae
Family Amphipleuraceae
<i>Frustulia amphipleuroides</i> (Grunow) Cleve-Euler
<i>Frustulia rhomboides</i> (Ehrenberg) De Toni
<i>Frustulia rhomboides</i> var. <i>capitata</i> (Mayer) R.M.Patrick
<i>Frustulia rhomboides</i> var. <i>crassinervia</i> (Brébisson ex W.Smith) Ross
<i>Frustulia rhomboides</i> var. <i>saxonica</i> (Rabenhorst) De Toni
<i>Frustulia vulgaris</i> (Thwaites) De Toni
Family Brachysiraceae
<i>Brachysira brebissonii</i> R.Ross in Hartley, R.Ross & D.M.Williams
Family Diadesmidaceae
<i>Luticola mutica</i> Kützing

[표 9] 계속

Family Neidiaceae
<i>Neidium affine</i> (Ehrenberg) Pfitzer
<i>Neidium affine</i> var. <i>humeris</i> Reimer in R.M.Patrick & Reimer
<i>Neidium alpinum</i> Hustedt
<i>Neidium ampliatum</i> (Ehrenberg) Krammer in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Neidium bisulcatum</i> (Lagerstedt) Cleve
<i>Neidium iridis</i> (Ehrenberg) Cleve
<i>Neidium productum</i> (W.Smith) Cleve
.
Suborder Sellaphorineae
Family Pinnulariaceae
<i>Pinnularia acidophila</i> G.Hofmann & Krammer in Krammer
<i>Pinnularia appendiculata</i> (C.Agardh) Schaarschmidt
<i>Pinnularia bacilliformis</i> Krammer
<i>Pinnularia borealis</i> Ehrenberg
<i>Pinnularia borealis</i> var. <i>rectangulata</i> Hustedt
<i>Pinnularia brevicostata</i> Cleve
<i>Pinnularia divergens</i> W.Smith
<i>Pinnularia divergentissima</i> (Grunow) Cleve
<i>Pinnularia gibba</i> (Ehrenberg) Ehrenberg
<i>Pinnularia hilseana</i> var. <i>japonica</i> Kobayasi in Kobayasi & Ando
<i>Pinnularia karelica</i> Cleve
<i>Pinnularia major</i> (Kützing) Rabenhorst
<i>Pinnularia microstauron</i> (Ehrenberg) Cleve
<i>Pinnularia microstauron</i> var. <i>nonfasciata</i> Krammer
<i>Pinnularia notabilis</i> Krammer in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Pinnularia rhombarea</i> var. <i>variareada</i> Krammer
<i>Pinnularia rhombarea</i> Krammer in Metzeltin & Lange-Bertalot
<i>Pinnularia schoenfelderii</i> Krammer
<i>Pinnularia stomatophora</i> (Grunow) Cleve
<i>Pinnularia subcapitata</i> var. <i>elongata</i> Krammer
<i>Pinnularia subcapitata</i> var. <i>subrostrata</i> Krammer
<i>Pinnularia subcapitata</i> W.Gregory
<i>Pinnularia sudetica</i> Hilse
<i>Pinnularia tabellaria</i> Ehrenberg
<i>Pinnularia viridis</i> (Nitzsch) Ehrenberg
.
Suborder Diploneidinea
Family Diploneidaceae
<i>Diploneis boldtiana</i> Cleve
<i>Diploneis elliptica</i> (Kützing) Cleve

[표 9] 계속

<i>Diploneis oblongella</i> (Nägeli ex Kützing) Cleve-Euler
<i>Diploneis ovalis</i> (Hilse) Cleve
<i>Diploneis parma</i> Cleve
<i>Diploneis subovalis</i> Cleve
Suborder Naviculineae
Family Naviculaceae
<i>Caloneis bacillum</i> (Grunow) Cleve
<i>Caloneis lenzii</i> Krasske
<i>Caloneis leptosoma</i> (Grunow) Krammer in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Caloneis silicula</i> (Ehrenberg) Cleve
<i>Caloneis tenuis</i> (W.Gregory) Krammer in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Gyrosigma acuminatum</i> (Kützing) Rabenhorst
<i>Gyrosigma pseudokuetzingii</i> Kobayasi in Kobayasi
<i>Gyrosigma scalproides</i> (Rabenhorst) Cleve
<i>Navicula accomoda</i> Hustedt
<i>Navicula americana</i> Ehrenberg
<i>Navicula amphiceropsis</i> Lange-Bertalot & U.Rumrich in U.Rumrich, Lange-Bertalot & M.Rumrich
<i>Navicula angusta</i> Grunow
<i>Navicula atomus</i> var. <i>permitis</i> (Hustedt) Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Navicula bacillum</i> Ehrenberg
<i>Navicula broetzii</i> Lange-Bertalot & E.Reichardt in Lange-Bertalot & Metzeltin
<i>Navicula capitata</i> (Ehrenberg) R.Ross
<i>Navicula capitatoradiata</i> H.Germain ex Gasse
<i>Navicula cincta</i> (Ehrenberg) Ralfs in Pritchard
<i>Navicula clementis</i> Grunow
<i>Navicula cocconeiformis</i> W.Gregory ex Greville
<i>Navicula cohnii</i> (Hilse) Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Navicula concentrica</i> J.R.Carter in J.R.Carter & Bailey-Watts
<i>Navicula confervacea</i> (Kützing) Grunow in Van Heurck
<i>Navicula contenta</i> Grunow in Van Heurck
<i>Navicula contenta</i> var. <i>biceps</i> (Grunow) Van Heurck
<i>Navicula cryptocephala</i> Kützing
<i>Navicula cryptotenella</i> Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Navicula cuspidata</i> (Kützing) Kützing 1844
<i>Navicula decussis</i> Østrup
<i>Navicula elginensis</i> var. <i>neglecta</i> R.M.Patrick
<i>Navicula elginensis</i> (W.Gregory) Ralfs in Pritchard
<i>Navicula erifuga</i> Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Navicula explanata</i> Hustedt
<i>Navicula festiva</i> Krasske

[표 9] 계속

<i>Navicula frustulum</i> Hustedt
<i>Navicula gallica</i> var. <i>perpusilla</i> (Grunow) Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Navicula goeppertiana</i> (Bleisch) H.L.Smith
<i>Navicula gregaria</i> Donkin
<i>Navicula hasta</i> Pantocsek
<i>Navicula helensis</i> Schulz
<i>Navicula ignota</i> Krasske
<i>Navicula inconspicua</i> W.Gregory
<i>Navicula laevis</i> Kützing
<i>Navicula lanceolata</i> Ehrenberg
<i>Navicula mediocris</i> Krasske
<i>Navicula microcephala</i> Grunow
<i>Navicula micropunctata</i> (H.Germain) H.Kobayasi & T.Nagumo
<i>Navicula minima</i> Grunow in Van Heurck
<i>Navicula minuscula</i> Grunow in Van Heurck
<i>Navicula minusculoides</i> Hustedt
<i>Navicula mutica</i> var. <i>ventricosa</i> (Kützing) Cleve & Grunow
<i>Navicula neoventricosa</i> Hustedt
<i>Navicula nipponica</i> (Skvortsov) Lange-Bertalot
<i>Navicula notha</i> J.H.Wallace
<i>Navicula peregrina</i> (Ehrenberg) Kützing
<i>Navicula perminuta</i> Grunow in Van Heurck
<i>Navicula placenta</i> Ehrenberg
<i>Navicula protracta</i> Grunow in Cleve & Grunow
<i>Navicula pseudolanceolata</i> Lange-Bertalot
<i>Navicula pupula</i> Kützing
<i>Navicula pupula</i> var. <i>capitata</i> Skvortsov & Meyer
<i>Navicula pupula</i> var. <i>rectangularis</i> (W.Gregory) Cleve & Grunow
<i>Navicula pupula</i> var. <i>subcapitata</i> Hustedt
<i>Navicula radiosa</i> Kützing
<i>Navicula radiosafallax</i> Lange-Bertalot
<i>Navicula rhynchocephala</i> Kützing
<i>Navicula saprophila</i> Lange-Bertalot & Bonik
<i>Navicula saxophila</i> W.Bock ex Hustedt
<i>Navicula schroeteri</i> F.Meister
<i>Navicula seminulum</i> Grunow
<i>Navicula soehrensensis</i> var. <i>hassiacae</i> (Krasske) Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot
<i>Navicula stroemii</i> Hustedt
<i>Navicula subminuscula</i> Manguin
<i>Navicula subtilissima</i> Cleve
<i>Navicula symmetrica</i> R.M.Patrick

[표 9] 계속

<i>Navicula tenelloides</i> Hustedt	
<i>Navicula thienemannii</i> Hustedt	
<i>Navicula tripunctata</i> (O.F.Müller) Bory in Bory de Saint-Vincent	
<i>Navicula trivialis</i> Lange-Bertalot	
<i>Navicula tuscula</i> (Ehrenberg) Grunow in Van Heurck	
<i>Navicula ventralis</i> Krasske	
<i>Navicula viridula</i> (Kützing) Ehrenberg	
<i>Navicula viridula</i> var. <i>linearis</i> Hustedt	
<i>Navicula viridula</i> var. <i>rostellata</i> (Kützing) Cleve	
<i>Navicula viridula</i> var. <i>rostrata</i> Skvortsov	
<i>Navicula zanonii</i> Hustedt	
Family Stauroneidaceae	
<i>Stauroneis anceps</i> Ehrenberg	
<i>Stauroneis legumen</i> var. <i>nipponica</i> (Skvortsov) H.Kobayasi & K.Ando	
<i>Stauroneis kriegeri</i> R.M.Patrick	
<i>Stauroneis phoenicenteron</i> (Nitzsch) Ehrenberg	
Order Rhopalodiales 활동말목	
Family Rhopalodiaceae	
<i>Epithemia adnata</i> (Kützing) Brébisson	
<i>Rhopalodia gibberula</i> (Ehrenberg) O.Müller	
<i>Rhopalodia operculata</i> (C.Agardh) Håkanasson	
Order Surirellales 방패돌말목	
Family Surirellales incertae sedis	
<i>Surirella angusta</i> Kützing	
<i>Surirella biseriata</i> Brébisson in Brébisson & Godey	
<i>Surirella capronii</i> Brébisson & Kitton in Kitton	
<i>Surirella elegans</i> Ehrenberg	
<i>Surirella lata</i> W.Smith	
<i>Surirella librile</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	
<i>Surirella linearis</i> W.Smith	
<i>Surirella linearis</i> var. <i>constricta</i> Grunow	
<i>Surirella minuta</i> Brébisson ex Kützing	
<i>Surirella pantocsekii</i> F.Meister	
<i>Surirella robusta</i> Ehrenberg	
<i>Surirella splendida</i> (Ehrenberg) Kützing	
<i>Surirella tenera</i> W.Gregory	

[표 9] 계속

Order Thalassiophysales
Family Catenulaceae
<i>Amphora angusta</i> W.Gregory
<i>Amphora copulata</i> (Kützing) Schoeman & R.E.M.Archibald
<i>Amphora inariensis</i> Krammer
<i>Amphora montana</i> Krasske
<i>Amphora ovalis</i> (Kützing) Kützing
<i>Amphora pediculus</i> (Kützing) Grunow in A.W.F.Schmidt
<i>Amphora veneta</i> Kützing
Subclass Eunotiophycidae 눈썬돌말아강
Order Eunotiales 눈썬돌말목
Family Eunotiaceae
<i>Eunotia arctica</i> Hustedt
<i>Eunotia arctica</i> var. <i>simplex</i> Hustedt
<i>Eunotia arculus</i> Lange-Bertalot & Nörpel in Lange-Bertalot
<i>Eunotia arcus</i> Ehrenberg
<i>Eunotia bilunaris</i> (Ehrenberg) Schaarschmidt in Kanitz
<i>Eunotia bilunaris</i> var. <i>mucophila</i> Lange-Bertalot, Nörpel-Schempp & E.Alles in Alles, Nörpel-Schempp & Lange-Bertalot
<i>Eunotia circumborealis</i> Lange-Bertalot & Nörpel in Lange-Bertalot
<i>Eunotia denticulata</i> (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst
<i>Eunotia diodon</i> Ehrenberg
<i>Eunotia exigua</i> (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst
<i>Eunotia exigua</i> var. <i>bidens</i> Hustedt
<i>Eunotia flexuosa</i> (Brébisson ex Kützing) Kützing
<i>Eunotia formica</i> Ehrenberg
<i>Eunotia gracilis</i> W.Smith
<i>Eunotia hexaglyphis</i> Ehrenberg
<i>Eunotia implicata</i> Nörpel, Lange-Bertalot & Alles in Alles, Nörpel-Schempp & Lange-Bertalot
<i>Eunotia incisa</i> W.Smith ex W.Gregory
<i>Eunotia intermedia</i> (Krasske ex Hustedt) Nörpel & Lange-Bertalot in Lange-Bertalot
<i>Eunotia major</i> (W.Smith) Rabenhorst
<i>Eunotia microcephala</i> Krasske
<i>Eunotia minor</i> (Kützing) Grunow in Van Heurck
<i>Eunotia monodon</i> Ehrenberg
<i>Eunotia muscicola</i> Krasske
<i>Eunotia muscicola</i> var. <i>perminuta</i> (Grunow) Nörpel & Lange-Bertalot in Lange-Bertalot
<i>Eunotia muscicola</i> var. <i>tridentula</i> Nörpel & Lange-Bertalot in Lange-Bertalot
<i>Eunotia naegelii</i> Migula
<i>Eunotia osoresanensis</i> Negoro
<i>Eunotia papilio</i> (Ehrenberg) Grunow

[표 9] 계속

<i>Eunotia parallela</i> Ehrenberg
<i>Eunotia parallela</i> var. <i>angusta</i> Grunow
<i>Eunotia pectinalis</i> (Kützing) Rabenhorst
<i>Eunotia praerupta</i> Ehrenberg
<i>Eunotia praerupta</i> var. <i>excelsa</i> Krasske
<i>Eunotia pseudoserra</i> P.E. De Oliveira & M. Steinitz-Kannan
<i>Eunotia rhomboidea</i> Hustedt
<i>Eunotia septentrionalis</i> Østrup
<i>Eunotia serra</i> Ehrenberg
<i>Eunotia silvahercynia</i> Nörpel, Van Sull & Lange-Bertalot in Alles, Nörpel-Schempp, & Lange-Bertalot
<i>Eunotia soleirolii</i> (Kützing) Rabenhorst
<i>Eunotia tenella</i> (Grunow) Hustedt in A.W.F.Schmidt
<i>Eunotia tenelloides</i> Kobayasi, Ando & Nagumo
<i>Eunotia tridentula</i> var. <i>perminuta</i> Grunow in van Heurck
<i>Eunotia ursamaioris</i> Lange-Bertalot & Nörpel-Schempp in Lange-Bertalot & Genkal
<i>Eunotia veneris</i> (Kützing) De Toni

Subclass Fragilariophycidae 위배선규조아강

Order Fragilariales 김발돌말목

Family Fragilariaceae

<i>Fragilaria bidens</i> Heiberg
<i>Fragilaria brevistriata</i> Grunow in Van Heurck
<i>Fragilaria capitellata</i> (Grunow) J.B.Petersen
<i>Fragilaria capucina</i> Desmazières
<i>Fragilaria capucina</i> var. <i>mesolepta</i> (Rabenhorst) Rabenhorst
<i>Fragilaria capucina</i> var. <i>rumpens</i> (Kützing) Lange-Bertalot ex Bukhtiyarova
<i>Fragilaria construens</i> (Ehrenberg) Grunow 1
<i>Fragilaria construens</i> f. <i>binodis</i> (Ehrenberg) Hustedt
<i>Fragilaria construens</i> f. <i>venter</i> (Ehrenberg) Hustedt
<i>Fragilaria construens</i> var. <i>binodis</i> (Ehrenberg) Grunow
<i>Fragilaria construens</i> var. <i>venter</i> (Ehrenberg) Grunow in Van Heurck
<i>Fragilaria crotonensis</i> Kitton
<i>Fragilaria crotonensis</i> var. <i>oregona</i> Sovereign
<i>Fragilaria elliptica</i> Schumann 1867
<i>Fragilaria exigua</i> Grunow in Cleve & Möller
<i>Fragilaria famelica</i> (Kützing) Lange-Bertalot
<i>Fragilaria fasciculata</i> (C.Agardh) Lange-Bertalot
<i>Fragilaria fragilarioides</i> (Grunow) Chohnoky
<i>Fragilaria goulardii</i> (Brébisson ex Cleve & Grunow) Lange-Bertalot
<i>Fragilaria gracilis</i> Østrup
<i>Fragilaria nanana</i> Lange-Bertalot

[표 9] 계속

<i>Fragilaria parva</i> (Grunow) A.Tuji & D.M.Williams
<i>Fragilaria pinnata</i> Ehrenberg
<i>Fragilaria pinnata</i> var. <i>lancettula</i> (Schumann) Hustedt in A.W.F.Schmidt
<i>Fragilaria pseudoconstruens</i> Marciniak
<i>Fragilaria pulchella</i> (Ralfs ex Kützing) Lange-Bertalot
<i>Fragilaria radians</i> (Kützing) D.M.Williams & Round
<i>Fragilaria recapitellata</i> Lange-Bertalot & Metzeltin in Metzeltin, Lange-Bertalot & Nergui
<i>Fragilaria rumpens</i> var. <i>fragilarioides</i> (Grunow) A.Cleve
<i>Fragilaria Ina</i> (Nitzsch) Lange-Bertalot
<i>Fragilaria vaucheriae</i> (Kützing) J.B.Petersen
<i>Synedra acus</i> Kützing
<i>Synedra acus</i> var. <i>angustissima</i> (Grunow) Van Heurck
<i>Synedra delicatissima</i> W.Smith
<i>Synedra familiaris</i> Kützing
<i>Synedra inaequalis</i> H.Kobayasi
<i>Synedra pulchella</i> (Ralfs ex Kützing) Kützing
<i>Synedra ulna</i> var. <i>contracta</i> Østrup
<i>Synedra ulna</i> var. <i>oxyrhynchus</i> (Kützing) O'Meara
<i>Synedra ulna</i> var. <i>ramesii</i> (Héribaude-Joseph) Hustedt

Order Licmophorales 민부채돌말목

Family Ulnariaceae

<i>Hannaea arcus</i> (Ehrenberg) R.M.Patrick in R.M.Patrick & C.W.Reimer
<i>Hannaea arcus</i> var. <i>amphioxys</i> (Rabenhorst) R.M.Patrick
<i>Hannaea arcus</i> var. <i>recta</i> (Cleve) M.Idei in H.Kobayasi & al.
<i>Hannaea arcus</i> var. <i>subarcus</i> (Y.Iwahashi) J.H.Lee in Lee & al.
<i>Tabularia fasciculata</i> (C.Agardh) D.M.Williams & Round
<i>Ulnaria delicatissima</i> var. <i>angustissima</i> (Grunow) Aboal & P.C.Silva

Order Tabellariales 불록뼈돌말목

Family Tabellariaceae

<i>Asterionella formosa</i> Hassall
<i>Asterionella japonica</i> Cleve in Cleve & Möller
<i>Diatoma anceps</i> (Ehrenberg) Kirchner
<i>Diatoma hyemalis</i> (Roth) Heiberg
<i>Diatoma maxima</i> (Grunow) Fricke in A.W.F.Schmidt
<i>Diatoma mesodon</i> (Ehrenberg) Kützing
<i>Diatoma vulgaris</i> Bory
<i>Meridion circulare</i> (Greville) C.Agardh
<i>Meridion circulare</i> var. <i>constrictum</i> (Ralfs) Van Heurck
<i>Tabellaria fenestrata</i> (Lyngbye) Kützing
<i>Tabellaria fenestrata</i> var. <i>intermedia</i> Grunow in Van Heurck
<i>Tabellaria flocculosa</i> (Roth) Kützing
<i>Tabellaria ventricosa</i> Kützing

다. 참고문헌

- 국립공원공단. 2000. 지리산 모니터링 보고서.
- 국립공원공단. 2004. 지리산국립공원 자원모니터링 보고서. 제2부 특정분야 자원모니터링.
- 국립공원공단. 1998. 설악산국립공원 백담계곡 계류생태계 조사 및 보존대책.
- 국립공원공단. 2000. 설악산국립공원 백담계곡 모니터링 3차년도 보고서.
- 국립공원연구원. 2006-2018. 2기, 3기 국립공원자연자원조사.
- 국립공원연구원. 2007. 국립공원 내륙습지 정밀조사.
- 김광용, 김광훈, 김영환, 김정화, 김한순, 김혈근, 김형석, 남기완, 부성민, 손철한, 신현웅, 오윤식, 유순애, 이경, 이기완, 이정호, 이진애, 이진환, 이해복, 정익교, 조경재, 최종기, 한명수, 한태준. 2003. 조류생물학. 월드사이언스. 서울. 398p.
- 김영환. 2010. 조류학. 2판. 바이오사이언스. 616p.
- 박정원. 2010. 국립공원내 담수조류의 현황. 국립공원연구지 1(1): 65-75.
- 윤양호, 김종덕, 오석진. 2012. 미세조류의 경이로운 세계와 산업적 이용. - 에너지, 식량 및 환경 분야의 미래자원 - 전남대학교출판부. 352p.
- 이인규, 부성민, 이상희. 2004. 조류의 다양성과 계통. 라이프사이언스. 서울. 262p.
- 장진성. 홍석표. 2012. 조류, 균류와 식물에 대한 국제명명규약(멜버른규약). 국립수목원. 광릉. 197p.
- 최영길, 한명수, 안태영, 곽노태. 2000. 담수의 부영양화. 신광문화사. 서울. 광주. 278p.

국립공원 공원자원조사 현지조사표 통합DB 구축

발행일 | 2020. 12.

발행인 | 국립공원연구원장 최승운

발행처 | 국립공원관리공단 국립공원연구원

(26441) 강원도 원주시 단구로 171

홈페이지 | <http://research.knps.or.kr>

가격 | 비매품

ISBN 979-11-90016-87-2 93400

본 출판물은 저작권법에 따라 보호되는 저작물이므로 국립공원공단
국립공원연구원의 사전 승인 없이 무단 복제 및 전재를 금합니다.